

表 4562 出口部感染罹患回数(回/年) APD使用の有無別（腹膜透析単独患者）

| APD使用の有無 | なし | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回以上 | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|---------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| なし (%) | 1,872 (55.2) | 301 (54.3) | 78 (52.3) | 22 (48.9) | 9 (37.5) | 6 (46.2) | 6 (50.0) | | 1 (100.0) | 4 (28.6) | 2,299 (54.7) | 5 (55.6) | 134 (57.3) | 2,438 (54.8) |
| あり (%) | 1,519 (44.8) | 253 (45.7) | 71 (47.7) | 23 (51.1) | 15 (62.5) | 7 (53.8) | 6 (50.0) | | | 10 (71.4) | 1,904 (45.3) | 4 (44.4) | 100 (42.7) | 2,008 (45.2) |
| 合計 (%) | 3,391 (100.0) | 554 (100.0) | 149 (100.0) | 45 (100.0) | 24 (100.0) | 13 (100.0) | 12 (100.0) | | 1 (100.0) | 14 (100.0) | 4,203 (100.0) | 9 (100.0) | 234 (100.0) | 4,446 (100.0) |
| 不明 | 10 | 3 | | | | | | | | | 13 | 15 | 2 | 30 |
| 記載なし | 64 | 8 | 1 | | | | | | | | 73 | 37 | 2,602 | 2,712 |
| 総計 | 3,465 | 565 | 150 | 45 | 24 | 13 | 12 | | 1 | 14 | 4,289 | 61 | 2,838 | 7,188 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査