

表 4567 出口部感染罹患回数(回/年) 治療方法(新分類)別 (PD・HD(F)等併用患者)

治療方法 (新分類)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD) (%)	409 (81.3)	66 (13.1)	10 (2.0)	5 (1.0)	2 (0.4)	7 (1.4)	2 (0.4)			2 (0.4)	503 (100.0)	7	379	889
腹膜透析 (APD) (%)	209 (78.3)	35 (13.1)	11 (4.1)	7 (2.6)	3 (1.1)	1 (0.4)		1 (0.4)			267 (100.0)	11	223	501
腹膜透析 (CCPD) (%)	175 (79.9)	29 (13.2)	12 (5.5)	1 (0.5)			1 (0.5)		1 (0.5)		219 (100.0)	2	137	358
合計 (%)	793 (80.2)	130 (13.1)	33 (3.3)	13 (1.3)	5 (0.5)	8 (0.8)	3 (0.3)		2 (0.2)	2 (0.2)	989 (100.0)	20	739	1,748
記載なし (%)														
総計 (%)	793 (80.2)	130 (13.1)	33 (3.3)	13 (1.3)	5 (0.5)	8 (0.8)	3 (0.3)		2 (0.2)	2 (0.2)	989 (100.0)	20	739	1,748

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査