

表 135 2015年導入患者 生検等により確認された原疾患

| 原疾患            | 男 性           | 女 性         | 記 載 な し | 総 計           |
|----------------|---------------|-------------|---------|---------------|
| 慢性糸球体腎炎        | 157 (10.9)    | 90 (12.0)   |         | 247 (11.3)    |
| IgA腎炎          | 236 (16.4)    | 161 (21.4)  |         | 397 (18.1)    |
| その他の増殖性腎炎      | 37 (2.6)      | 15 (2.0)    |         | 52 (2.4)      |
| 膜性腎症           | 22 (1.5)      | 22 (2.9)    |         | 44 (2.0)      |
| 膜性増殖性腎炎        | 30 (2.1)      | 9 (1.2)     |         | 39 (1.8)      |
| 慢性腎孟腎炎         | 7 (0.5)       | 3 (0.4)     |         | 10 (0.5)      |
| その他の間質腎炎       | 12 (0.8)      | 21 (2.8)    |         | 33 (1.5)      |
| 急速進行性糸球体腎炎     | 55 (3.8)      | 43 (5.7)    |         | 98 (4.5)      |
| 妊娠腎／妊娠中毒症      |               | 3 (0.4)     |         | 3 (0.1)       |
| その他分類不能の腎炎     | 11 (0.8)      | 3 (0.4)     |         | 14 (0.6)      |
| 遺伝性腎炎          | 5 (0.3)       | 3 (0.4)     |         | 8 (0.4)       |
| 多発性囊胞腎         | 58 (4.0)      | 28 (3.7)    |         | 86 (3.9)      |
| 腎硬化症           | 158 (11.0)    | 67 (8.9)    |         | 225 (10.3)    |
| 悪性高血圧          | 15 (1.0)      | 4 (0.5)     |         | 19 (0.9)      |
| 糖尿病性腎症         | 113 (7.8)     | 32 (4.3)    |         | 145 (6.6)     |
| 1型糖尿病          | 27 (1.9)      | 23 (3.1)    |         | 50 (2.3)      |
| 2型糖尿病          | 448 (31.1)    | 150 (20.0)  |         | 598 (27.3)    |
| SLE腎炎          | 7 (0.5)       | 35 (4.7)    |         | 42 (1.9)      |
| その他の自己免疫性腎炎    | 16 (1.1)      | 15 (2.0)    |         | 31 (1.4)      |
| アミロイド腎         | 22 (1.5)      | 21 (2.8)    |         | 43 (2.0)      |
| 痛風腎            | 3 (0.2)       | 3 (0.4)     |         | 6 (0.3)       |
| 先天性代謝異常に基づく腎不全 | 1 (0.1)       |             |         | 1 (0.0)       |
| 総計             | 1,440 (100.0) | 751 (100.0) |         | 2,191 (100.0) |

数値右のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査