

表 136 2015年導入患者死亡原因分類(性別との関係)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	342 (%) (23.5)	192 (%) (27.3)	534 (%) (24.7)		534 (%) (24.7)
脳血管障害	82 (%) (5.6)	42 (%) (6.0)	124 (%) (5.7)		124 (%) (5.7)
感染症	366 (%) (25.2)	191 (%) (27.1)	557 (%) (25.8)		557 (%) (25.8)
消化管出血	27 (%) (1.9)	10 (%) (1.4)	37 (%) (1.7)		37 (%) (1.7)
悪性腫瘍	179 (%) (12.3)	57 (%) (8.1)	236 (%) (10.9)		236 (%) (10.9)
悪液質/尿毒症	72 (%) (4.9)	34 (%) (4.8)	106 (%) (4.9)		106 (%) (4.9)
心筋梗塞	45 (%) (3.1)	16 (%) (2.3)	61 (%) (2.8)		61 (%) (2.8)
カリウム中毒/頓死	23 (%) (1.6)	8 (%) (1.1)	31 (%) (1.4)		31 (%) (1.4)
肝硬変症	25 (%) (1.7)	8 (%) (1.1)	33 (%) (1.5)		33 (%) (1.5)
自殺/拒否	12 (%) (0.8)	3 (%) (0.4)	15 (%) (0.7)		15 (%) (0.7)
腸閉塞	17 (%) (1.2)	7 (%) (1.0)	24 (%) (1.1)		24 (%) (1.1)
肺血栓/肺塞栓	2 (%) (0.1)	1 (%) (0.1)	3 (%) (0.1)		3 (%) (0.1)
災害・事故死	5 (%) (0.3)	3 (%) (0.4)	8 (%) (0.4)		8 (%) (0.4)
その他	148 (%) (10.2)	83 (%) (11.8)	231 (%) (10.7)		231 (%) (10.7)
不明	110 (%) (7.6)	49 (%) (7.0)	159 (%) (7.4)		159 (%) (7.4)
合計	1,455 (%) (100.0)	704 (%) (100.0)	2,159 (%) (100.0)		2,159 (%) (100.0)
記載なし	1	2	3		3
総計	1,456	706	2,162		2,162

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査