

表 139 2015年導入患者死亡原因分類（原疾患との関係）

原疾患	心不全	脳血管障害	感染症	消化管出血	悪性腫瘍	悪液質/尿毒症	心筋梗塞	カリウム中毒/頓死	肝硬変症	自殺/拒否	腸閉塞	肺血栓/肺塞栓	災害・事故死	その他	不明	合計	記載なし	総計	
慢性糸球体腎炎 (%)	85 (28.2)	24 (8.0)	69 (22.9)	5 (1.7)	25 (8.3)	13 (4.3)	12 (4.0)	3 (1.0)	4 (1.3)	1 (0.3)	3 (1.0)	3 (1.0)	1 (0.3)	35 (11.6)	18 (6.0)	301 (100.0)		301	
慢性腎盂腎炎 (%)	2 (8.7)		8 (34.8)		5 (21.7)	1 (4.3)		2 (8.7)			2 (8.7)			2 (8.7)	1 (4.3)	23 (100.0)		23	
急速進行性糸球体腎炎 (%)	9 (13.2)	5 (7.4)	28 (41.2)	3 (4.4)	4 (5.9)	2 (2.9)	1 (1.5)	1 (1.5)	1 (1.5)		2 (2.9)			8 (11.8)	4 (5.9)	68 (100.0)		68	
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)														1 (100.0)		1 (100.0)		1	
その他の分類不能の腎炎 (%)	2 (25.0)		3 (37.5)		1 (12.5)		1 (12.5)							1 (12.5)		8 (100.0)		8	
多発性嚢胞腎 (%)	7 (26.9)	1 (3.8)	2 (7.7)	2 (7.7)	4 (15.4)		2 (7.7)		2 (7.7)	1 (3.8)				3 (11.5)	2 (7.7)	26 (100.0)		26	
腎硬化症 (%)	81 (27.8)	10 (3.4)	85 (29.2)	10 (3.4)	24 (8.2)	20 (6.9)	6 (2.1)	6 (2.1)	3 (1.0)	1 (0.3)	5 (1.7)		1 (0.3)	27 (9.3)	12 (4.1)	291 (100.0)	1	292	
悪性高血圧 (%)	4 (44.4)	1 (11.1)	1 (11.1)		1 (11.1)			1 (11.1)							1 (11.1)	9 (100.0)		9	
糖尿病性腎症 (%)	182 (28.0)	55 (8.5)	165 (25.4)	12 (1.8)	53 (8.2)	28 (4.3)	21 (3.2)	14 (2.2)	7 (1.1)	5 (0.8)	6 (0.9)		4 (0.6)	49 (7.6)	48 (7.4)	649 (100.0)	1	650	
SLE腎炎 (%)	5 (17.2)	2 (6.9)	12 (41.4)		1 (3.4)	1 (3.4)	1 (3.4)		1 (3.4)					5 (17.2)	1 (3.4)	29 (100.0)		29	
アミロイド腎 (%)	5 (25.0)	2 (10.0)	5 (25.0)		3 (15.0)	1 (5.0)		1 (5.0)						3 (15.0)		20 (100.0)		20	
痛風腎 (%)	1 (50.0)													1 (50.0)		2 (100.0)		2	
先天性代謝異常による腎不全 (%)																			
腎・尿路結核 (%)										1 (100.0)						1 (100.0)		1	
腎・尿路結石 (%)	1 (33.3)		1 (33.3)											1 (33.3)		3 (100.0)		3	
腎・尿路腫瘍 (%)	3 (13.0)	1 (4.3)	3 (13.0)		14 (60.9)									1 (4.3)	1 (4.3)	23 (100.0)		23	
閉塞性尿路障害 (%)			1 (11.1)		7 (77.8)									1 (11.1)		9 (100.0)		9	
骨髄腫 (%)	4 (10.5)		5 (13.2)		27 (71.1)									1 (2.6)	1 (2.6)	38 (100.0)		38	
腎形成不全 (%)			2 (100.0)													2 (100.0)		2	
不明 (%)	100 (22.9)	16 (3.7)	115 (26.4)	2 (0.5)	37 (8.5)	23 (5.3)	9 (2.1)	2 (0.5)	8 (1.8)	4 (0.9)	6 (1.4)		1 (0.2)	58 (13.3)	55 (12.6)	436 (100.0)	1	437	
再導入 (%)	3 (30.0)	1 (10.0)	4 (40.0)					1 (10.0)		1 (10.0)						10 (100.0)		10	
その他 (%)	40 (19.0)	6 (2.9)	48 (22.9)	3 (1.4)	30 (14.3)	17 (8.1)	8 (3.8)		7 (3.3)	1 (0.5)				1 (0.5)	34 (16.2)	15 (7.1)	210 (100.0)		210
合計 (%)	534 (24.7)	124 (5.7)	557 (25.8)	37 (1.7)	238 (10.9)	106 (4.9)	61 (2.8)	31 (1.4)	33 (1.5)	15 (0.7)	24 (1.1)	3 (0.1)	8 (0.4)	231 (10.7)	159 (7.4)	2,159 (100.0)	3	2,162	
記載なし (%)																			
総計 (%)	534 (24.7)	124 (5.7)	557 (25.8)	37 (1.7)	238 (10.9)	106 (4.9)	61 (2.8)	31 (1.4)	33 (1.5)	15 (0.7)	24 (1.1)	3 (0.1)	8 (0.4)	231 (10.7)	159 (7.4)	2,159 (100.0)	3	2,162	

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
©Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査