

表 140 2015年導入患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝慢性糸球体腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)											1 (100.0)	1 (16.7)	4 (21.1)	8 (30.8)	7 (21.9)	12 (24.0)	19 (26.0)	22 (34.9)	11 (40.7)		85 (28.2)			85 (28.2)	79.89	9.24
脳血管障害 (%)													2 (10.5)	3 (11.5)	3 (9.4)	4 (8.0)	5 (6.8)	5 (7.9)	2 (7.4)		24 (8.0)			24 (8.0)	78.25	8.60
感染症 (%)												2 (33.3)	5 (26.3)	5 (19.2)	8 (25.0)	10 (20.0)	19 (26.0)	16 (25.4)	4 (14.8)		69 (22.9)			69 (22.9)	78.58	8.56
消化管出血 (%)													1 (5.3)		1 (3.1)		2 (2.7)		1 (3.7)		5 (1.7)			5 (1.7)	78.80	10.23
悪性腫瘍 (%)													2 (10.5)	2 (7.7)	5 (15.6)	5 (10.0)	5 (6.8)	4 (6.3)	1 (3.7)	1 (33.3)	25 (8.3)			25 (8.3)	78.16	8.79
悪液質/尿毒症 (%)													1 (5.3)	1 (3.8)	2 (6.3)	4 (8.0)	2 (2.7)	1 (1.6)	1 (3.7)	1 (33.3)	13 (4.3)			13 (4.3)	78.54	9.44
心筋梗塞 (%)												2 (33.3)	1 (5.3)	2 (7.7)		2 (4.0)	3 (4.1)	2 (3.2)			12 (4.0)			12 (4.0)	73.83	10.84
カリウム中毒/頓死 (%)													1 (5.3)			1 (2.0)	1 (1.4)				3 (1.0)			3 (1.0)	72.67	11.15
肝硬変症 (%)													1 (5.3)	1 (3.8)		1 (2.0)	1 (1.4)				4 (1.3)			4 (1.3)	73.25	8.77
自殺/拒否 (%)																1 (2.0)					1 (0.3)			1 (0.3)	79.00	
腸閉塞 (%)																	3 (4.1)				3 (1.0)			3 (1.0)	80.33	0.58
肺血栓/肺塞栓 (%)															1 (3.1)			1 (1.6)	1 (3.7)		3 (1.0)			3 (1.0)	83.67	8.74
災害・事故死 (%)																		1 (1.6)			1 (0.3)			1 (0.3)	87.00	
その他 (%)													1 (5.3)	1 (3.8)	4 (12.5)	7 (14.0)	10 (13.7)	8 (12.7)	3 (11.1)	1 (33.3)	35 (11.6)			35 (11.6)	81.86	7.00
不明 (%)										1 (100.0)		1 (16.7)		3 (11.5)	1 (3.1)	3 (6.0)	3 (4.1)	3 (4.8)	3 (11.1)		18 (6.0)			18 (6.0)	77.22	12.37
合計 (%)										1 (100.0)	1 (100.0)	6 (100.0)	19 (100.0)	26 (100.0)	32 (100.0)	50 (100.0)	73 (100.0)	63 (100.0)	27 (100.0)	3 (100.0)	301 (100.0)			301 (100.0)	78.97	9.05
記載なし																										
総計										1	1	6	19	26	32	50	73	63	27	3	301			301	78.97	9.05

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査