

表 142 2015年導入患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患=急速進行性糸球体腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)											1 (100.0)	1 (14.3)	1 (10.0)	1 (6.3)	2 (16.7)	1 (7.1)	2 (33.3)		9 (13.2)		9	79.44	10.63			
脳血管障害 (%)											1 (100.0)	1 (42.9)	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (16.7)	1 (7.1)			5 (7.4)		5	75.60	12.26			
感染症 (%)											3 (10.0)	5 (10.0)	8 (50.0)	6 (50.0)	5 (35.7)	1 (16.7)			28 (41.2)		28	78.18	6.57			
消化管出血 (%)											1 (10.0)	1 (10.0)	2 (12.5)	2 (16.7)	1 (7.1)	1 (16.7)			3 (4.4)		3	79.00	4.36			
悪性腫瘍 (%)											2 (14.3)	2 (14.3)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (14.3)	1 (14.3)			4 (5.9)		4	83.00	7.07			
悪液質/尿毒症 (%)											1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	2 (14.3)	2 (14.3)			2 (2.9)		2	89.00				
心筋梗塞 (%)											1 (14.3)	1 (14.3)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (14.3)	1 (14.3)			1 (1.5)		1	66.00				
カリウム中毒/頓死 (%)											1 (100.0)	1 (100.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)			1 (1.5)		1	74.00				
肝硬変症 (%)											1 (14.3)	1 (14.3)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)			1 (1.5)		1	52.00				
自殺/拒否 (%)											1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)			1 (1.5)		1	(1.5)				
腸閉塞 (%)											1 (14.3)	1 (14.3)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)			2 (2.9)		2	77.00	15.56			
肺血栓/肺塞栓 (%)											1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)			1 (2.9)		2	(2.9)				
災害・事故死 (%)											1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)			1 (1.5)		1	52.00				
その他 (%)											1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)			1 (1.5)		1	(1.5)				
不明 (%)											1 (14.3)	1 (14.3)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	1 (10.0)			1 (1.5)		1	66.00				
合計 (%)											1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)			1 (100.0)		1 (100.0)	68	78.62	8.62		
記載なし																										
総計											1	1	1	1	7	10	16	12	14	6	68		68	78.62	8.62	

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査