

表 146 2015年導入患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝腎硬化症

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)									1 (50.0)				2 (66.7)	2 (15.4)	6 (21.4)	14 (29.8)	22 (28.9)	25 (27.5)	8 (30.8)	1 (33.3)	81 (27.8)			81 (27.8)	81.85	8.01
脳血管障害 (%)															2 (7.1)	1 (2.1)	5 (6.6)	1 (1.1)	1 (3.8)		10 (3.4)			10 (3.4)	80.50	6.06
感染症 (%)									1 (50.0)		1 (100.0)	1 (100.0)	1 (33.3)	3 (23.1)	8 (28.6)	16 (34.0)	19 (25.0)	29 (31.9)	5 (19.2)	1 (33.3)	85 (29.2)			85 (29.2)	80.52	8.96
消化管出血 (%)															2 (7.1)	1 (2.1)	3 (3.9)	3 (3.3)	1 (3.8)		10 (3.4)			10 (3.4)	81.40	6.72
悪性腫瘍 (%)														4 (30.8)	5 (17.9)	4 (8.5)	6 (7.9)	5 (5.5)			24 (8.2)			24 (8.2)	78.04	6.68
悪液質/尿毒症 (%)														1 (7.7)	1 (3.6)	2 (4.3)	4 (5.3)	7 (7.7)	4 (15.4)	1 (33.3)	20 (6.9)			20 (6.9)	84.25	7.16
心筋梗塞 (%)															1 (3.6)	1 (2.1)	1 (1.3)	2 (2.2)	1 (3.8)		6 (2.1)			6 (2.1)	83.33	7.76
カリウム中毒/頓死 (%)															1 (3.6)	2 (4.3)	1 (1.3)	2 (2.2)			6 (2.1)			6 (2.1)	81.00	6.03
肝硬変症 (%)																	2 (2.6)	1 (1.1)			3 (1.0)			3 (1.0)	83.33	3.06
自殺/拒否 (%)																	1 (1.3)				1 (0.3)			1 (0.3)	84.00	
腸閉塞 (%)														2 (15.4)				2 (2.2)	1 (3.8)		5 (1.7)			5 (1.7)	80.20	11.12
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																		1 (1.1)			1 (0.3)			1 (0.3)	87.00	
その他 (%)																4 (8.5)	9 (11.8)	9 (9.9)	5 (19.2)		27 (9.3)			27 (9.3)	84.59	5.03
不明 (%)														1 (7.7)	2 (7.1)	2 (4.3)	3 (3.9)	4 (4.4)			12 (4.1)			12 (4.1)	80.00	6.98
合計 (%)									2 (100.0)		1 (100.0)	1 (100.0)	3 (100.0)	13 (100.0)	28 (100.0)	47 (100.0)	76 (100.0)	91 (100.0)	26 (100.0)	3 (100.0)	291 (100.0)			291 (100.0)	81.45	7.81
記載なし																1					1			1	76.00	
総計									2		1	1	3	13	28	48	76	91	26	3	292			292	81.43	7.81

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査