

表 149 2015年導入患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患=SLE腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差											
心不全 (%)										1 (25.0)	1 (20.0)	2 (40.0)	2 (50.0)	1 (33.3)	1 (50.0)	1 (33.3)	2 (66.7)	1 (66.7)	1 (25.0)	1 (20.0)	5 (17.2)	5 (17.2)	12.62														
脳血管障害 (%)										1 (100.0)	2 (50.0)	3 (75.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	2 (66.7)	1 (66.7)	1 (25.0)	1 (20.0)	2 (6.9)	2 (6.9)	67.00														
感染症 (%)										1 (100.0)	2 (50.0)	3 (75.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	2 (66.7)	1 (66.7)	1 (25.0)	1 (20.0)	12 (41.4)	12 (41.4)	69.17														
消化管出血 (%)										1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	11.88												
悪性腫瘍 (%)										1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	60.00												
悪液質/尿毒症 (%)										1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	75.00												
心筋梗塞 (%)										1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	84.00												
カリウム中毒/頓死 (%)										1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	3.4												
肝硬変症 (%)										1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	72.00												
自殺/拒否 (%)										1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	3.4												
腸閉塞 (%)										1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	84.00												
肺血栓/肺塞栓 (%)										1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	3.4												
災害・事故死 (%)										1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	3.4												
その他 (%)										1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	6.42												
不明 (%)										1 (25.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)	75.00												
合計 (%)										1 (100.0)	4 (100.0)	4 (100.0)	5 (100.0)	5 (100.0)	3 (100.0)	4 (100.0)	4 (100.0)	3 (100.0)	3 (100.0)	29 (100.0)	70.24	10.10															
記載なし																																					
総計										1	4	4	5	5	3	4	3				29			29	70.24	10.10											

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査