

表 161 2015年導入患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝その他

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)										1 (25.0)		1 (11.1)	2 (9.5)	5 (20.0)	3 (15.0)	11 (26.8)	7 (16.7)	7 (21.9)	3 (50.0)		40 (19.0)			40 (19.0)	77.42	10.13
脳血管障害 (%)											1 (25.0)		1 (4.8)	3 (12.0)		1 (2.4)					6 (2.9)			6 (2.9)	66.00	9.34
感染症 (%)					1 (100.0)				2 (66.7)	2 (50.0)	1 (25.0)	3 (33.3)	2 (9.5)	3 (12.0)	8 (40.0)	9 (22.0)	8 (19.0)	7 (21.9)	2 (33.3)		48 (22.9)			48 (22.9)	72.38	14.85
消化管出血 (%)													1 (4.8)		1 (5.0)			1 (3.1)			3 (1.4)			3 (1.4)	73.33	12.06
悪性腫瘍 (%)									1 (33.3)	1 (25.0)			10 (47.6)	5 (20.0)	5 (25.0)	2 (4.9)	5 (11.9)	1 (3.1)			30 (14.3)			30 (14.3)	68.27	10.20
悪液質/尿毒症 (%)												1 (11.1)	2 (9.5)	1 (4.0)	1 (5.0)	3 (7.3)	6 (14.3)	3 (9.4)			17 (8.1)			17 (8.1)	76.82	9.34
心筋梗塞 (%)												2 (22.2)	1 (4.8)	1 (4.0)		1 (2.4)	2 (4.8)	1 (3.1)			8 (3.8)			8 (3.8)	71.25	12.19
カリウム中毒/頓死 (%)																										
肝硬変症 (%)											2 (50.0)	1 (11.1)		2 (8.0)			2 (4.8)				7 (3.3)			7 (3.3)	66.14	13.32
自殺/拒否 (%)																		1 (3.1)			1 (0.5)			1 (0.5)	85.00	
腸閉塞 (%)																										
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																1 (2.4)					1 (0.5)			1 (0.5)	79.00	
その他 (%)						1 (100.0)							1 (4.8)	4 (16.0)	2 (10.0)	9 (22.0)	6 (14.3)	9 (28.1)	1 (16.7)	1 (100.0)	34 (16.2)			34 (16.2)	77.71	11.95
不明 (%)											1 (11.1)		1 (4.8)	1 (4.0)		4 (9.8)	6 (14.3)	2 (6.3)			15 (7.1)			15 (7.1)	77.20	8.21
合計 (%)					1 (100.0)	1 (100.0)			3 (100.0)	4 (100.0)	4 (100.0)	9 (100.0)	21 (100.0)	25 (100.0)	20 (100.0)	41 (100.0)	42 (100.0)	32 (100.0)	6 (100.0)	1 (100.0)	210 (100.0)			210 (100.0)	73.99	12.11
記載なし																										
総計					1	1			3	4	4	9	21	25	20	41	42	32	6	1	210			210	73.99	12.11

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査