

表 217 2015年末患者、年齢、原疾患別人数(男性)

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差	
慢性糸球体腎炎 (%)		3 (20.0)	3 (12.5)	20 (32.8)	39 (31.2)	167 (36.8)	407 (36.7)	905 (34.4)	1,890 (32.3)	2,846 (30.3)	3,690 (28.6)	4,920 (29.5)	7,415 (29.5)	10,563 (28.6)	8,501 (27.8)	6,897 (25.5)	4,977 (24.5)	2,332 (24.6)	509 (23.2)	65 (23.9)	56,149 (27.9)		1 (100.0)	56,150 (27.9)	66.11	12.49	
慢性腎盂腎炎 (%)				4 (3.2)	9 (2.0)	24 (2.2)	42 (1.6)	76 (1.3)	94 (0.8)	112 (0.7)	139 (0.6)	242 (0.7)	197 (0.6)	152 (0.6)	116 (0.6)	64 (0.7)	12 (0.5)	1,362 (0.7)			1,362 (0.7)			1,362 (0.7)	64.41	14.16	
急速進行性糸球 体腎炎 (%)				1 (0.8)	8 (1.8)	9 (0.8)	20 (0.8)	34 (0.6)	53 (0.6)	56 (0.4)	80 (0.5)	138 (0.5)	234 (0.6)	221 (0.7)	213 (0.8)	133 (0.7)	71 (0.7)	13 (0.6)	3 (1.1)	1,287 (0.6)			1,287 (0.6)	68.25	12.51		
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)								1 (0.0)	2 (0.0)		1 (0.0)	2 (0.0)		3 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)					12 (0.0)			12 (0.0)	60.08	14.62	
その他の分類不能 の腎炎 (%)	1 (7.1)		6 (25.0)	4 (6.6)	10 (8.0)	18 (4.0)	32 (2.9)	46 (1.7)	50 (0.9)	66 (0.7)	70 (0.5)	67 (0.4)	63 (0.3)	104 (0.3)	104 (0.3)	82 (0.3)	64 (0.3)	24 (0.3)	8 (0.4)	2 (0.7)	821 (0.4)			821 (0.4)	59.93	17.18	
多発性囊胞腎 (%)	4 (28.6)	1 (6.7)		1 (1.6)	3 (2.4)	6 (1.3)	16 (1.4)	63 (2.4)	208 (3.6)	391 (4.2)	631 (4.9)	764 (4.6)	1,003 (4.0)	1,139 (3.1)	797 (2.6)	568 (2.1)	381 (1.9)	159 (1.7)	43 (2.0)	5 (1.8)	6,183 (3.1)			6,183 (3.1)	64.02	11.65	
腎硬化症 (%)			1 (4.2)	1 (1.6)	3 (2.4)	21 (4.6)	54 (4.9)	123 (4.7)	299 (5.1)	513 (5.5)	626 (4.9)	882 (5.3)	1,424 (5.7)	2,579 (7.0)	2,936 (9.6)	3,556 (13.1)	3,743 (18.4)	2,250 (23.7)	655 (29.9)	79 (29.0)	19,745 (9.8)			19,745 (9.8)	73.11	11.84	
悪性高血圧 (%)					1 (0.8)	8 (1.8)	29 (2.6)	83 (3.2)	139 (2.4)	144 (1.5)	177 (1.4)	166 (1.0)	184 (0.7)	243 (0.7)	182 (0.6)	169 (0.6)	139 (0.7)	81 (0.9)	25 (1.1)	1 (0.4)	1,771 (0.9)			1,771 (0.9)	62.12	14.82	
糖尿病性腎症 (%)		1 (6.7)		3 (4.9)	4 (3.2)	12 (2.6)	188 (16.9)	740 (28.1)	2,101 (36.0)	3,895 (41.5)	5,824 (45.1)	7,653 (45.8)	11,648 (46.3)	17,233 (46.7)	13,643 (44.5)	11,348 (41.9)	7,381 (36.3)	2,633 (27.7)	455 (20.7)	44 (16.2)	84,806 (42.1)	1 (50.0)		84,807 (42.1)	66.71	11.15	
SLE腎炎 (%)				3 (4.9)	3 (2.4)	11 (2.4)	15 (1.4)	25 (1.0)	47 (0.8)	43 (0.5)	56 (0.4)	54 (0.3)	74 (0.3)	119 (0.3)	75 (0.2)	81 (0.3)	58 (0.3)	29 (0.3)	2 (0.1)		695 (0.3)			695 (0.3)	62.57	15.19	
アミロイド腎 (%)								3 (0.1)	13 (0.2)	14 (0.1)	14 (0.1)	12 (0.1)	29 (0.1)	31 (0.1)	29 (0.1)	31 (0.1)	16 (0.1)	7 (0.1)	1 (0.0)		200 (0.1)			200 (0.1)	65.52	12.71	
痛風腎 (%)						2 (0.4)	4 (0.4)	7 (0.3)	23 (0.4)	33 (0.4)	62 (0.5)	65 (0.4)	114 (0.5)	181 (0.5)	180 (0.6)	157 (0.6)	76 (0.4)	30 (0.3)	5 (0.2)		939 (0.5)			939 (0.5)	67.65	11.22	
先天性代謝異常 による腎不全 (%)	1 (7.1)			6 (9.8)	6 (4.8)	12 (2.6)	9 (0.8)	18 (0.7)	27 (0.5)	16 (0.2)	11 (0.1)	11 (0.1)	15 (0.1)	12 (0.0)	6 (0.0)	3 (0.0)	3 (0.0)	3 (0.0)			159 (0.1)			159 (0.1)	47.45	16.83	
腎・尿路結核 (%)											2 (0.0)	5 (0.0)	10 (0.0)	23 (0.1)	26 (0.1)	11 (0.0)	15 (0.1)	10 (0.1)	4 (0.2)		106 (0.1)			106 (0.1)	73.15	8.95	
腎・尿路結石 (%)							1 (0.0)	4 (0.1)	11 (0.1)	13 (0.1)	37 (0.2)	38 (0.2)	67 (0.2)	72 (0.2)	62 (0.2)	46 (0.2)	23 (0.2)	5 (0.2)			379 (0.2)			379 (0.2)	69.96	10.67	
腎・尿路腫瘍 (%)						2 (0.4)	1 (0.1)	4 (0.2)	7 (0.1)	7 (0.1)	16 (0.1)	29 (0.2)	66 (0.3)	114 (0.5)	143 (0.5)	138 (0.5)	107 (0.6)	54 (0.6)	13 (0.6)		701 (0.3)			701 (0.3)	72.33	10.34	
閉塞性尿路障害 (%)		1 (6.7)			1 (0.8)	6 (1.3)	12 (1.1)	23 (0.9)	32 (0.5)	35 (0.4)	30 (0.2)	15 (0.1)	35 (0.1)	74 (0.2)	70 (0.2)	59 (0.3)	55 (0.3)	29 (0.3)	3 (0.1)	2 (0.7)	482 (0.2)			482 (0.2)	64.36	16.12	
骨髄腫 (%)								2 (0.1)	1 (0.0)	3 (0.0)	10 (0.1)	7 (0.0)	20 (0.1)	42 (0.1)	26 (0.1)	32 (0.1)	25 (0.1)	15 (0.2)	1 (0.0)		184 (0.1)			184 (0.1)	70.67	10.82	
腎形成不全 (%)	4 (28.6)	8 (53.3)	11 (45.8)	9 (14.8)	16 (12.8)	33 (7.3)	45 (4.1)	63 (2.4)	46 (0.8)	47 (0.5)	23 (0.2)	17 (0.1)	19 (0.1)	23 (0.1)	20 (0.1)	14 (0.1)	11 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)		411 (0.2)			411 (0.2)	43.79	18.27	
不明 (%)				3 (4.9)	15 (12.0)	46 (10.1)	142 (12.8)	275 (10.5)	542 (9.3)	773 (8.2)	957 (7.4)	1,214 (7.3)	1,977 (7.9)	2,961 (8.0)	2,611 (8.5)	2,807 (10.4)	2,410 (11.9)	1,397 (14.7)	370 (16.9)	63 (23.2)	18,563 (9.2)	1 (50.0)		18,564 (9.2)	68.89	13.14	
再導入 (%)			1 (4.2)	1 (1.6)	5 (4.0)	12 (2.6)	33 (3.0)	52 (2.0)	105 (1.8)	162 (1.7)	224 (1.7)	239 (1.4)	224 (0.9)	195 (0.5)	86 (0.3)	50 (0.2)	28 (0.1)	11 (0.1)	6 (0.3)		1,434 (0.7)			1,434 (0.7)	56.88	11.95	
その他 (%)	4 (28.6)	1 (6.7)	2 (8.3)	10 (16.4)	14 (11.2)	81 (17.8)	90 (8.1)	134 (5.1)	198 (3.4)	255 (2.7)	313 (2.4)	343 (2.1)	529 (2.1)	744 (2.0)	706 (2.3)	630 (2.3)	535 (2.6)	273 (2.9)	62 (2.8)	8 (2.9)	4,932 (2.4)			4,932 (2.4)	65.46	15.10	
合計 (%)	14 (100.0)	15 (100.0)	24 (100.0)	61 (100.0)	125 (100.0)	454 (100.0)	1,110 (100.0)	2,630 (100.0)	5,844 (100.0)	9,386 (100.0)	12,900 (100.0)	16,694 (100.0)	25,164 (100.0)	36,926 (100.0)	30,632 (100.0)	27,061 (100.0)	20,320 (100.0)	9,496 (100.0)	2,193 (100.0)	272 (100.0)	201,321 (100.0)	2 (100.0)	1 (100.0)	201,324 (100.0)	67.07	12.37	
記載なし								1				1	2		5	3	1				13				13	69.31	11.79
総計	14	15	24	61	125	454	1,110	2,631	5,844	9,386	12,900	16,695	25,166	36,926	30,637	27,064	20,321	9,496	2,193	272	201,334	2	1	201,337	67.07	12.37	

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2015年調査