

表 228 2015年末患者、治療方法(新分類)、原疾患別

原疾患	施設血液透析	Off-line HDF	On-line HDF	Push/Pull HDF	ハイファイブレーション	IHDF	血液濾過	血液吸着透析 (リクセル等使用)	在宅血液透析	腹膜透析 (CAPD)	腹膜透析 (APD)	腹膜透析 (CCPD)	合計	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	70,315 (75.3)	2,179 (2.3)	15,603 (16.7)	38 (0.0)	100 (0.1)	1,017 (1.1)	1 (0.0)	983 (1.1)	281 (0.3)	1,648 (1.8)	783 (0.8)	399 (0.4)	93,347 (100.0)		93,347
慢性腎盂腎炎 (%)	2,272 (77.4)	62 (2.1)	438 (14.9)	3 (0.1)	4 (0.1)	26 (0.9)	1 (0.0)	22 (0.7)	10 (0.3)	53 (1.8)	30 (1.0)	14 (0.5)	2,935 (100.0)		2,935
急速進行性糸球 体腎炎 (%)	2,025 (81.7)	34 (1.4)	322 (13.0)	1 (0.0)	2 (0.1)	23 (0.9)		4 (0.2)	1 (0.0)	32 (1.3)	24 (1.0)	10 (0.4)	2,478 (100.0)		2,478
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)	1,052 (68.1)	60 (3.9)	346 (22.4)	1 (0.1)	2 (0.1)	18 (1.2)		38 (2.5)	1 (0.1)	16 (1.0)	7 (0.5)	4 (0.3)	1,545 (100.0)		1,545
その他の分極不 能の腎炎 (%)	1,031 (73.4)	24 (1.7)	223 (15.9)			31 (2.2)		12 (0.9)	6 (0.4)	36 (2.6)	24 (1.7)	18 (1.3)	1,405 (100.0)		1,405
多発性囊胞腎 (%)	8,869 (78.8)	173 (1.5)	1,774 (15.8)	4 (0.0)	5 (0.0)	99 (0.9)		41 (0.4)	28 (0.2)	128 (1.1)	107 (1.0)	28 (0.2)	11,256 (100.0)		11,256
腎硬化症 (%)	24,511 (82.2)	287 (1.0)	3,474 (11.7)	9 (0.0)	19 (0.1)	370 (1.2)	3 (0.0)	21 (0.1)	16 (0.1)	637 (2.1)	350 (1.2)	108 (0.4)	29,805 (100.0)		29,805
悪性高血圧 (%)	2,070 (79.1)	36 (1.4)	370 (14.1)			26 (1.0)		6 (0.2)	3 (0.1)	60 (2.3)	34 (1.3)	13 (0.5)	2,618 (100.0)		2,618
糖尿病性腎症 (%)	98,975 (82.3)	1,640 (1.4)	15,079 (12.5)	38 (0.0)	101 (0.1)	1,474 (1.2)	6 (0.0)	81 (0.1)	85 (0.1)	1,557 (1.3)	919 (0.8)	323 (0.3)	120,278 (100.0)		120,278
SLE腎炎 (%)	1,702 (76.4)	57 (2.6)	376 (16.9)		3 (0.1)	21 (0.9)		14 (0.6)	8 (0.4)	25 (1.1)	17 (0.8)	4 (0.2)	2,227 (100.0)		2,227
アミロイド腎 (%)	358 (77.5)	14 (3.0)	68 (14.7)			5 (1.1)			2 (0.4)	10 (2.2)	5 (1.1)		462 (100.0)		462
痛風腎 (%)	853 (79.3)	21 (2.0)	150 (14.0)		3 (0.3)	7 (0.7)		8 (0.7)	1 (0.1)	15 (1.4)	8 (0.7)	9 (0.8)	1,075 (100.0)		1,075
先天性代謝異常 による腎不全 (%)	201 (73.4)	6 (2.2)	46 (16.8)			2 (0.7)			2 (0.7)	8 (2.9)	4 (1.5)	5 (1.8)	274 (100.0)		274
腎・尿路結核 (%)	153 (78.5)	1 (0.5)	28 (14.4)			4 (2.1)		7 (3.6)		2 (1.0)			195 (100.0)		195
腎・尿路結石 (%)	471 (81.1)	9 (1.5)	73 (12.6)			4 (0.7)		2 (0.3)	1 (0.2)	11 (1.9)	6 (1.0)	4 (0.7)	581 (100.0)		581
腎・尿路腫瘍 (%)	763 (83.8)	18 (2.0)	102 (11.2)			13 (1.4)				6 (0.7)	4 (0.4)	4 (0.4)	910 (100.0)		910
閉塞性尿路障害 (%)	589 (80.7)	9 (1.2)	97 (13.3)		1 (0.1)	7 (1.0)		5 (0.7)	1 (0.1)	10 (1.4)	8 (1.1)	3 (0.4)	730 (100.0)		730
骨髄腫 (%)	247 (84.9)	9 (3.1)	27 (9.3)						1 (0.3)	5 (1.7)	2 (0.7)		291 (100.0)		291
腎形成不全 (%)	439 (66.5)	15 (2.3)	115 (17.4)		2 (0.3)	11 (1.7)		5 (0.8)	1 (0.2)	18 (2.7)	39 (5.9)	15 (2.3)	660 (100.0)		660
不明 (%)	23,795 (79.6)	479 (1.6)	4,317 (14.4)	15 (0.1)	17 (0.1)	280 (0.9)	2 (0.0)	78 (0.3)	72 (0.2)	477 (1.6)	275 (0.9)	90 (0.3)	29,897 (100.0)		29,897
再導入 (%)	1,559 (71.4)	72 (3.3)	431 (19.7)		3 (0.1)	20 (0.9)		28 (1.3)	15 (0.7)	24 (1.1)	15 (0.7)	16 (0.7)	2,183 (100.0)		2,183
その他 (%)	6,462 (80.3)	126 (1.6)	1,061 (13.2)	1 (0.0)	5 (0.1)	82 (1.0)	3 (0.0)	21 (0.3)	20 (0.2)	124 (1.5)	114 (1.4)	25 (0.3)	8,044 (100.0)		8,044
合計 (%)	248,712 (79.4)	5,331 (1.7)	44,520 (14.2)	110 (0.0)	267 (0.1)	3,540 (1.1)	16 (0.0)	1,376 (0.4)	555 (0.2)	4,902 (1.6)	2,775 (0.9)	1,092 (0.3)	313,196 (100.0)		313,196
記載なし (%)	13 (61.9)	1 (4.8)	7 (33.3)										21 (100.0)		21
総計 (%)	248,725 (79.4)	5,332 (1.7)	44,527 (14.2)	110 (0.0)	267 (0.1)	3,540 (1.1)	16 (0.0)	1,376 (0.4)	555 (0.2)	4,902 (1.6)	2,775 (0.9)	1,092 (0.3)	313,217 (100.0)		313,217

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
*腹膜透析 (CCPD) は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
(©Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査