

表 245 2015年死亡患者(男性 年齢、原疾患)

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)					1 (16.7)		1 (8.3)	6 (20.7)	15 (17.2)	33 (16.8)	67 (18.3)	134 (21.6)	283 (21.8)	566 (21.8)	628 (20.7)	743 (21.0)	803 (21.7)	581 (22.9)	201 (24.4)	38 (25.2)	4,100 (21.6)			4,100 (21.6)	75.61	10.10
慢性腎盂腎炎 (%)					2 (33.3)	1 (16.7)		1 (3.4)	1 (1.1)	3 (1.5)	1 (0.3)	1 (0.2)	4 (0.3)	15 (0.6)	16 (0.5)	27 (0.8)	26 (0.7)	16 (0.6)	7 (0.8)		121 (0.6)			121 (0.6)	74.73	13.21
急速進行性糸球 体腎炎 (%)								1 (3.4)			3 (0.8)	5 (0.8)	4 (0.3)	22 (0.8)	41 (1.4)	40 (1.1)	41 (1.1)	30 (1.2)	10 (1.2)		197 (1.0)			197 (1.0)	76.82	8.86
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)																			1 (0.1)		1 (0.0)			1 (0.0)	93.00	
その他の分類不能 の腎炎 (%)								1 (3.4)		1 (0.5)	1 (0.3)	2 (0.3)	2 (0.2)	6 (0.2)	4 (0.1)	13 (0.4)	9 (0.2)	5 (0.2)	2 (0.2)	2 (1.3)	48 (0.3)			48 (0.3)	75.88	11.95
多発性囊胞腎 (%)										2 (1.1)	9 (1.0)	11 (1.8)	32 (2.5)	66 (2.5)	62 (2.0)	66 (1.9)	54 (1.5)	36 (1.4)	9 (1.1)		348 (1.8)			348 (1.8)	73.45	9.33
腎硬化症 (%)						1 (16.7)		2 (6.9)	5 (5.7)	8 (4.1)	19 (5.2)	21 (3.4)	59 (4.6)	123 (4.7)	244 (8.1)	351 (9.9)	582 (15.7)	517 (20.4)	206 (25.0)	38 (25.2)	2,176 (11.5)			2,176 (11.4)	80.35	8.85
悪性高血圧 (%)						1 (16.7)	1 (8.3)		2 (2.3)	2 (1.0)	2 (0.5)	5 (0.8)	10 (0.8)	12 (0.5)	11 (0.4)	17 (0.5)	28 (0.8)	19 (0.7)	9 (1.1)	1 (0.7)	120 (0.6)			120 (0.6)	75.42	12.99
糖尿病性腎症 (%)			1 (100.0)	2 (66.7)	1 (16.7)		4 (33.3)	13 (44.8)	41 (47.1)	95 (48.5)	205 (56.0)	349 (56.2)	696 (53.7)	1,401 (53.9)	1,506 (49.7)	1,590 (45.0)	1,370 (37.0)	770 (30.3)	191 (23.2)	30 (19.9)	8,265 (43.5)	1 (16.7)		8,266 (43.5)	73.25	9.92
SLE腎炎 (%)							1 (8.3)		1 (1.1)	4 (2.0)	3 (0.8)	6 (1.0)	10 (0.8)	4 (0.2)	14 (0.5)	18 (0.5)	11 (0.3)	8 (0.3)	2 (0.2)		82 (0.4)			82 (0.4)	70.93	12.39
アミロイド腎 (%)											2 (0.5)	2 (0.3)	3 (0.2)	4 (0.2)	6 (0.2)	11 (0.3)	4 (0.1)	2 (0.1)			34 (0.2)			34 (0.2)	72.03	8.94
痛風腎 (%)												2 (0.3)	4 (0.3)	9 (0.3)	15 (0.5)	15 (0.4)	12 (0.3)	11 (0.4)	1 (0.1)	1 (0.7)	70 (0.4)			70 (0.4)	76.27	8.45
先天性代謝異常 による腎不全 (%)	1 (100.0)											2 (0.3)	2 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)					7 (0.0)			7 (0.0)	57.71	24.68
腎・尿路結核 (%)													1 (0.1)		2 (0.1)	2 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.0)			9 (0.0)			9 (0.0)	77.33	8.51
腎・尿路結石 (%)										1 (0.5)		2 (0.3)	3 (0.2)	3 (0.1)	1 (0.0)	6 (0.2)	8 (0.2)	6 (0.2)			30 (0.2)			30 (0.2)	75.70	10.93
腎・尿路腫瘍 (%)												2 (0.3)	3 (0.2)	10 (0.4)	12 (0.4)	28 (0.8)	27 (0.7)	20 (0.8)	3 (0.4)	2 (1.3)	107 (0.6)			107 (0.6)	78.75	7.72
閉塞性尿路障害 (%)										1 (0.5)		1 (0.2)	1 (0.1)	3 (0.1)	5 (0.2)	6 (0.2)	9 (0.2)	10 (0.4)	2 (0.2)		38 (0.2)			38 (0.2)	78.71	9.57
骨髄腫 (%)									1 (1.1)	1 (0.5)	3 (0.8)	3 (0.5)	4 (0.3)	11 (0.4)	14 (0.5)	15 (0.4)	13 (0.4)	8 (0.3)			73 (0.4)			73 (0.4)	73.01	10.13
腎形成不全 (%)					1 (16.7)		1 (8.3)									3 (0.1)	2 (0.1)		2 (0.1)		9 (0.0)			9 (0.0)	66.22	23.94
不明 (%)						2 (33.3)	2 (16.7)	4 (13.8)	11 (12.6)	27 (13.8)	37 (10.1)	40 (6.4)	121 (9.3)	258 (9.9)	338 (11.2)	441 (12.5)	566 (15.3)	391 (15.4)	156 (18.9)	34 (22.5)	2,428 (12.8)	5 (83.3)		2,433 (12.8)	77.19	10.17
再導入 (%)							1 (8.3)				3 (1.5)	7 (0.8)	12 (1.1)	9 (0.3)	5 (0.2)	9 (0.3)	16 (0.4)	1 (0.0)	2 (0.2)	2 (1.3)	70 (0.4)			70 (0.4)	70.19	12.71
その他 (%)		1 (100.0)		1 (33.3)	1 (16.7)	1 (16.7)	1 (8.3)	1 (3.4)	9 (10.3)	15 (7.7)	11 (3.0)	26 (4.2)	44 (3.4)	77 (3.0)	102 (3.4)	132 (3.7)	116 (3.1)	105 (4.1)	23 (2.8)	3 (2.0)	669 (3.5)			669 (3.5)	74.33	11.81
合計 (%)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	3 (100.0)	6 (100.0)	6 (100.0)	12 (100.0)	29 (100.0)	87 (100.0)	196 (100.0)	366 (100.0)	621 (100.0)	1,298 (100.0)	2,601 (100.0)	3,030 (100.0)	3,533 (100.0)	3,698 (100.0)	2,539 (100.0)	825 (100.0)	151 (100.0)	19,002 (100.0)	6 (100.0)		19,008 (100.0)	75.21	10.29
記載なし																										
総計	1	1	1	3	6	6	12	29	87	196	366	621	1,298	2,601	3,030	3,533	3,698	2,539	825	151	19,002	6		19,008	75.21	10.29

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査