

表 246 2015年死亡患者(女性 年齢、原疾患)

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差	
慢性糸球体腎炎 (%)							1 (16.7)	2 (18.2)	7 (18.9)	12 (18.5)	21 (19.1)	63 (29.0)	110 (24.2)	260 (26.2)	338 (26.5)	421 (23.7)	488 (23.5)	503 (26.6)	248 (26.4)	59 (26.3)	2,533 (25.1)	1 (20.0)		2,534 (25.1)	78.52	10.00	
慢性腎盂腎炎 (%)									3 (8.1)	2 (3.1)	1 (0.9)	3 (1.4)	13 (2.9)	10 (1.0)	23 (1.8)	16 (0.9)	29 (1.4)	22 (1.2)	11 (1.2)	5 (2.2)	138 (1.4)			138 (1.4)	76.75	11.88	
急速進行性糸球 体腎炎 (%)							1 (16.7)	1 (9.1)			2 (1.8)	2 (0.9)	5 (1.1)	11 (1.1)	20 (1.6)	24 (1.4)	31 (1.5)	30 (1.6)	17 (1.8)	3 (1.3)	147 (1.5)			147 (1.5)	79.01	10.65	
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)											1 (0.9)	1 (0.5)	8 (1.8)	16 (1.1)	14 (1.0)	18 (0.8)	16 (0.1)	1 (0.1)			76 (0.8)			76 (0.8)	73.08	7.83	
その他の分類不能 の腎炎 (%)									1 (2.7)	1 (1.5)			1 (0.2)	6 (0.6)	1 (0.1)	6 (0.3)	6 (0.3)	9 (0.5)	3 (0.3)	1 (0.4)	35 (0.3)			35 (0.3)	78.11	12.43	
多発性囊胞腎 (%)										2 (3.1)	6 (5.5)	10 (4.6)	16 (3.5)	42 (4.2)	54 (4.2)	55 (3.1)	47 (2.3)	39 (2.1)	10 (1.1)	1 (0.4)	282 (2.8)			282 (2.8)	75.09	9.36	
腎硬化症 (%)									1 (2.7)	2 (3.1)	3 (2.7)	5 (2.3)	25 (5.5)	42 (4.2)	57 (4.5)	141 (8.0)	252 (12.2)	311 (16.5)	202 (21.5)	55 (24.6)	1,096 (10.9)			1,096 (10.9)	83.54	8.18	
悪性高血圧 (%)													2 (0.4)	9 (0.9)	6 (0.5)	5 (0.3)	12 (0.6)	16 (0.8)	6 (0.6)	2 (0.9)	58 (0.6)			58 (0.6)	80.34	9.20	
糖尿病性腎症 (%)			1 (50.0)	1 (16.7)			1 (16.7)	1 (9.1)	16 (43.2)	34 (52.3)	43 (39.1)	84 (38.7)	189 (41.5)	412 (41.5)	528 (41.4)	700 (39.5)	749 (36.1)	551 (29.2)	213 (22.7)	41 (18.3)	3,564 (35.4)	1 (20.0)		3,565 (35.4)	76.74	9.87	
SLE腎炎 (%)							1 (16.7)	5 (45.5)	1 (2.7)	4 (6.2)	4 (3.6)	13 (6.0)	10 (2.2)	29 (2.9)	17 (1.3)	12 (0.7)	17 (0.8)	9 (0.5)	4 (0.4)		126 (1.3)			126 (1.2)	68.70	13.08	
アミロイド腎 (%)											1 (0.9)	2 (0.9)	7 (1.5)	6 (0.6)	10 (0.8)	14 (0.8)	9 (0.4)	5 (0.3)	2 (0.2)		56 (0.6)			56 (0.6)	74.43	9.14	
痛風腎 (%)																3 (0.2)	2 (0.1)	2 (0.1)			7 (0.1)			7 (0.1)	81.57	4.72	
先天性代謝異常 による腎不全 (%)															2 (0.2)	2 (0.1)		1 (0.1)		5 (0.0)				5 (0.0)	75.80	6.76	
腎・尿路結核 (%)													1 (0.2)	1 (0.1)		1 (0.1)		3 (0.2)	1 (0.1)		7 (0.1)			7 (0.1)	79.43	11.87	
腎・尿路結石 (%)											1 (0.9)		1 (0.2)	2 (0.2)	2 (0.2)	5 (0.3)	5 (0.2)	4 (0.2)	2 (0.2)	1 (0.4)	23 (0.2)			23 (0.2)	79.22	10.47	
腎・尿路腫瘍 (%)													2 (0.4)	3 (0.3)	5 (0.4)	6 (0.3)	5 (0.2)	11 (0.6)	3 (0.3)	1 (0.4)	36 (0.4)			36 (0.4)	80.58	8.67	
閉塞性尿路障害 (%)							1 (16.7)		1 (2.7)	1 (1.5)				2 (0.2)	3 (0.2)	3 (0.2)	3 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.1)		17 (0.2)			17 (0.2)	71.88	16.46	
骨髄腫 (%)				1 (16.7)							1 (0.9)		3 (0.7)	2 (0.2)	4 (0.3)	8 (0.5)	5 (0.2)	7 (0.4)	1 (0.1)	1 (0.4)	33 (0.3)			33 (0.3)	75.76	13.91	
腎形成不全 (%)			1 (50.0)	1 (16.7)					1 (2.7)									1 (0.0)	2 (0.1)	1 (0.1)		7 (0.1)			7 (0.1)	60.57	35.44
不明 (%)				3 (50.0)				1 (9.1)	5 (13.5)	5 (7.7)	21 (19.1)	18 (8.3)	41 (9.0)	104 (10.5)	149 (11.7)	257 (14.5)	312 (15.1)	305 (16.2)	184 (19.6)	47 (21.0)	1,452 (14.4)	3 (60.0)		1,455 (14.4)	80.03	10.22	
再導入 (%)						1 (50.0)		1 (9.1)			2 (1.8)	5 (2.3)	4 (0.9)	7 (0.7)	3 (0.2)	5 (0.3)	6 (0.3)	2 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.4)	38 (0.4)			38 (0.4)	69.18	14.14	
その他 (%)					1 (100.0)	1 (50.0)	1 (16.7)		1 (2.7)	2 (3.1)	3 (2.7)	11 (5.1)	17 (3.7)	29 (2.9)	38 (3.0)	71 (4.0)	78 (3.8)	53 (2.8)	28 (3.0)	6 (2.7)	340 (3.4)			340 (3.4)	77.57	10.83	
合計 (%)			2 (100.0)	6 (100.0)	1 (100.0)	2 (100.0)	6 (100.0)	11 (100.0)	37 (100.0)	65 (100.0)	110 (100.0)	217 (100.0)	455 (100.0)	993 (100.0)	1,274 (100.0)	1,773 (100.0)	2,073 (100.0)	1,888 (100.0)	939 (100.0)	224 (100.0)	10,076 (100.0)	5 (100.0)		10,081 (100.0)	78.27	10.28	
記載なし																											
総計			2	6	1	2	6	11	37	65	110	217	455	993	1,274	1,773	2,073	1,888	939	224	10,076	5		10,081	78.27	10.28	

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査