

表 251 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	4,720	2,824	7,544		7,544
(%)	(24.8)	(28.1)	(26.0)		(26.0)
脳血管障害	1,188	728	1,916		1,916
(%)	(6.3)	(7.2)	(6.6)		(6.6)
感染症	4,286	2,107	6,393		6,393
(%)	(22.6)	(20.9)	(22.0)		(22.0)
消化管出血	279	142	421		421
(%)	(1.5)	(1.4)	(1.4)		(1.4)
悪性腫瘍	2,013	704	2,717		2,717
(%)	(10.6)	(7.0)	(9.3)		(9.3)
悪液質/尿毒症	740	599	1,339		1,339
(%)	(3.9)	(6.0)	(4.6)		(4.6)
心筋梗塞	867	378	1,245		1,245
(%)	(4.6)	(3.8)	(4.3)		(4.3)
カリウム中毒/頓死	538	210	748		748
(%)	(2.8)	(2.1)	(2.6)		(2.6)
肝硬変症	206	74	280		280
(%)	(1.1)	(0.7)	(1.0)		(1.0)
自殺/拒否	155	57	212		212
(%)	(0.8)	(0.6)	(0.7)		(0.7)
腸閉塞	194	113	307		307
(%)	(1.0)	(1.1)	(1.1)		(1.1)
肺血栓/肺塞栓	42	30	72		72
(%)	(0.2)	(0.3)	(0.2)		(0.2)
災害・事故死	94	34	128		128
(%)	(0.5)	(0.3)	(0.4)		(0.4)
その他	1,663	1,111	2,774		2,774
(%)	(8.8)	(11.0)	(9.5)		(9.5)
不明	2,012	956	2,968		2,968
(%)	(10.6)	(9.5)	(10.2)		(10.2)
合計	18,997	10,067	29,064		29,064
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし	11	14	25		25
総計	19,008	10,081	29,089		29,089

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査