

表 252 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(北海道)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	261 (%) (28.2)	171 (%) (35.2)	432 (%) (30.6)		432 (%) (30.6)
脳血管障害	45 (%) (4.9)	29 (%) (6.0)	74 (%) (5.2)		74 (%) (5.2)
感染症	178 (%) (19.2)	63 (%) (13.0)	241 (%) (17.1)		241 (%) (17.1)
消化管出血	11 (%) (1.2)	6 (%) (1.2)	17 (%) (1.2)		17 (%) (1.2)
悪性腫瘍	90 (%) (9.7)	29 (%) (6.0)	119 (%) (8.4)		119 (%) (8.4)
悪液質/尿毒症	54 (%) (5.8)	34 (%) (7.0)	88 (%) (6.2)		88 (%) (6.2)
心筋梗塞	37 (%) (4.0)	19 (%) (3.9)	56 (%) (4.0)		56 (%) (4.0)
カリウム中毒/頓死	18 (%) (1.9)	16 (%) (3.3)	34 (%) (2.4)		34 (%) (2.4)
肝硬変症	10 (%) (1.1)	3 (%) (0.6)	13 (%) (0.9)		13 (%) (0.9)
自殺/拒否	11 (%) (1.2)	2 (%) (0.4)	13 (%) (0.9)		13 (%) (0.9)
腸閉塞	10 (%) (1.1)	3 (%) (0.6)	13 (%) (0.9)		13 (%) (0.9)
肺血栓/肺塞栓	1 (%) (0.1)	1 (%) (0.2)	2 (%) (0.1)		2 (%) (0.1)
災害・事故死	2 (%) (0.2)	3 (%) (0.6)	5 (%) (0.4)		5 (%) (0.4)
その他	80 (%) (8.6)	50 (%) (10.3)	130 (%) (9.2)		130 (%) (9.2)
不明	117 (%) (12.6)	57 (%) (11.7)	174 (%) (12.3)		174 (%) (12.3)
合計	925 (%) (100.0)	486 (%) (100.0)	1,411 (%) (100.0)		1,411 (%) (100.0)
記載なし					
総計	925	486	1,411		1,411

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査