

表 255 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(宮城県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	74	40	114		114
(%)	(24.3)	(27.8)	(25.4)		(25.4)
脳血管障害	22	15	37		37
(%)	(7.2)	(10.4)	(8.2)		(8.2)
感染症	61	22	83		83
(%)	(20.0)	(15.3)	(18.5)		(18.5)
消化管出血	1	2	3		3
(%)	(0.3)	(1.4)	(0.7)		(0.7)
悪性腫瘍	33	11	44		44
(%)	(10.8)	(7.6)	(9.8)		(9.8)
悪液質/尿毒症	11	6	17		17
(%)	(3.6)	(4.2)	(3.8)		(3.8)
心筋梗塞	17	4	21		21
(%)	(5.6)	(2.8)	(4.7)		(4.7)
カリウム中毒/頓死	9	2	11		11
(%)	(3.0)	(1.4)	(2.4)		(2.4)
肝硬変症	4		4		4
(%)	(1.3)		(0.9)		(0.9)
自殺/拒否	1		1		1
(%)	(0.3)		(0.2)		(0.2)
腸閉塞	3	3	6		6
(%)	(1.0)	(2.1)	(1.3)		(1.3)
肺血栓/肺塞栓		1	1		1
(%)		(0.7)	(0.2)		(0.2)
災害・事故死					
(%)					
その他	37	24	61		61
(%)	(12.1)	(16.7)	(13.6)		(13.6)
不明	32	14	46		46
(%)	(10.5)	(9.7)	(10.2)		(10.2)
合計	305	144	449		449
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	305	144	449		449

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査