

表 257 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(山形県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	38 (%) (21.7)	20 (%) (18.3)	58 (%) (20.4)		58 (%) (20.4)
脳血管障害	15 (%) (8.6)	11 (%) (10.1)	26 (%) (9.2)		26 (%) (9.2)
感染症	29 (%) (16.6)	17 (%) (15.6)	46 (%) (16.2)		46 (%) (16.2)
消化管出血	1 (%) (0.6)	4 (%) (3.7)	5 (%) (1.8)		5 (%) (1.8)
悪性腫瘍	16 (%) (9.1)	4 (%) (3.7)	20 (%) (7.0)		20 (%) (7.0)
悪液質/尿毒症	13 (%) (7.4)	12 (%) (11.0)	25 (%) (8.8)		25 (%) (8.8)
心筋梗塞	6 (%) (3.4)	1 (%) (0.9)	7 (%) (2.5)		7 (%) (2.5)
カリウム中毒/頓死	3 (%) (1.7)	2 (%) (1.8)	5 (%) (1.8)		5 (%) (1.8)
肝硬変症	2 (%) (1.1)		2 (%) (0.7)		2 (%) (0.7)
自殺/拒否	2 (%) (1.1)		2 (%) (0.7)		2 (%) (0.7)
腸閉塞		1 (%) (0.9)	1 (%) (0.4)		1 (%) (0.4)
肺血栓/肺塞栓					
災害・事故死		2 (%) (1.8)	2 (%) (0.7)		2 (%) (0.7)
その他	34 (%) (19.4)	20 (%) (18.3)	54 (%) (19.0)		54 (%) (19.0)
不明	16 (%) (9.1)	15 (%) (13.8)	31 (%) (10.9)		31 (%) (10.9)
合計	175 (%) (100.0)	109 (%) (100.0)	284 (%) (100.0)		284 (%) (100.0)
記載なし					
総計	175	109	284		284

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査