

表 259 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(茨城県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	155	83	238		238
(%)	(34.1)	(36.1)	(34.8)		(34.8)
脳血管障害	38	21	59		59
(%)	(8.4)	(9.1)	(8.6)		(8.6)
感染症	74	45	119		119
(%)	(16.3)	(19.6)	(17.4)		(17.4)
消化管出血	5	2	7		7
(%)	(1.1)	(0.9)	(1.0)		(1.0)
悪性腫瘍	47	14	61		61
(%)	(10.4)	(6.1)	(8.9)		(8.9)
悪液質/尿毒症	6	8	14		14
(%)	(1.3)	(3.5)	(2.0)		(2.0)
心筋梗塞	23	10	33		33
(%)	(5.1)	(4.3)	(4.8)		(4.8)
カリウム中毒/頓死	10	1	11		11
(%)	(2.2)	(0.4)	(1.6)		(1.6)
肝硬変症	5	2	7		7
(%)	(1.1)	(0.9)	(1.0)		(1.0)
自殺/拒否	2		2		2
(%)	(0.4)		(0.3)		(0.3)
腸閉塞	7	3	10		10
(%)	(1.5)	(1.3)	(1.5)		(1.5)
肺血栓/肺塞栓	2		2		2
(%)	(0.4)		(0.3)		(0.3)
災害・事故死	3		3		3
(%)	(0.7)		(0.4)		(0.4)
その他	31	21	52		52
(%)	(6.8)	(9.1)	(7.6)		(7.6)
不明	46	20	66		66
(%)	(10.1)	(8.7)	(9.6)		(9.6)
合計	454	230	684		684
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	454	230	684		684

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査