

表 260 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(栃木県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	89 (%) (26.1)	51 (%) (35.2)	140 (%) (28.8)		140 (%) (28.8)
脳血管障害	18 (%) (5.3)	10 (%) (6.9)	28 (%) (5.8)		28 (%) (5.8)
感染症	80 (%) (23.5)	25 (%) (17.2)	105 (%) (21.6)		105 (%) (21.6)
消化管出血	5 (%) (1.5)	3 (%) (2.1)	8 (%) (1.6)		8 (%) (1.6)
悪性腫瘍	33 (%) (9.7)	6 (%) (4.1)	39 (%) (8.0)		39 (%) (8.0)
悪液質/尿毒症	18 (%) (5.3)	16 (%) (11.0)	34 (%) (7.0)		34 (%) (7.0)
心筋梗塞	22 (%) (6.5)	4 (%) (2.8)	26 (%) (5.3)		26 (%) (5.3)
カリウム中毒/頓死	6 (%) (1.8)	3 (%) (2.1)	9 (%) (1.9)		9 (%) (1.9)
肝硬変症	3 (%) (0.9)	1 (%) (0.7)	4 (%) (0.8)		4 (%) (0.8)
自殺/拒否	2 (%) (0.6)		2 (%) (0.4)		2 (%) (0.4)
腸閉塞		2 (%) (1.4)	2 (%) (0.4)		2 (%) (0.4)
肺血栓/肺塞栓					
災害・事故死	1 (%) (0.3)		1 (%) (0.2)		1 (%) (0.2)
その他	36 (%) (10.6)	13 (%) (9.0)	49 (%) (10.1)		49 (%) (10.1)
不明	28 (%) (8.2)	11 (%) (7.6)	39 (%) (8.0)		39 (%) (8.0)
合計	341 (%) (100.0)	145 (%) (100.0)	486 (%) (100.0)		486 (%) (100.0)
記載なし					
総計	341	145	486		486

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査