

表 262 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(埼玉県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	275	164	439		439
(%)	(28.2)	(35.7)	(30.6)		(30.6)
脳血管障害	50	30	80		80
(%)	(5.1)	(6.5)	(5.6)		(5.6)
感染症	177	71	248		248
(%)	(18.2)	(15.5)	(17.3)		(17.3)
消化管出血	14	7	21		21
(%)	(1.4)	(1.5)	(1.5)		(1.5)
悪性腫瘍	85	25	110		110
(%)	(8.7)	(5.4)	(7.7)		(7.7)
悪液質/尿毒症	48	28	76		76
(%)	(4.9)	(6.1)	(5.3)		(5.3)
心筋梗塞	58	26	84		84
(%)	(6.0)	(5.7)	(5.9)		(5.9)
カリウム中毒/頓死	21	7	28		28
(%)	(2.2)	(1.5)	(2.0)		(2.0)
肝硬変症	6	4	10		10
(%)	(0.6)	(0.9)	(0.7)		(0.7)
自殺/拒否	9	1	10		10
(%)	(0.9)	(0.2)	(0.7)		(0.7)
腸閉塞	6	2	8		8
(%)	(0.6)	(0.4)	(0.6)		(0.6)
肺血栓/肺塞栓	1	1	2		2
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.1)		(0.1)
災害・事故死	4		4		4
(%)	(0.4)		(0.3)		(0.3)
その他	82	32	114		114
(%)	(8.4)	(7.0)	(8.0)		(8.0)
不明	138	61	199		199
(%)	(14.2)	(13.3)	(13.9)		(13.9)
合計	974	459	1,433		1,433
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	974	459	1,433		1,433

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査