

表 263 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(千葉県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	228 (%) (26.6)	116 (%) (28.0)	344 (%) (27.1)		344 (%) (27.1)
脳血管障害	48 (%) (5.6)	42 (%) (10.1)	90 (%) (7.1)		90 (%) (7.1)
感染症	176 (%) (20.6)	83 (%) (20.0)	259 (%) (20.4)		259 (%) (20.4)
消化管出血	9 (%) (1.1)	9 (%) (2.2)	18 (%) (1.4)		18 (%) (1.4)
悪性腫瘍	86 (%) (10.0)	24 (%) (5.8)	110 (%) (8.7)		110 (%) (8.7)
悪液質/尿毒症	20 (%) (2.3)	21 (%) (5.1)	41 (%) (3.2)		41 (%) (3.2)
心筋梗塞	39 (%) (4.6)	18 (%) (4.3)	57 (%) (4.5)		57 (%) (4.5)
カリウム中毒/頓死	23 (%) (2.7)	4 (%) (1.0)	27 (%) (2.1)		27 (%) (2.1)
肝硬変症	7 (%) (0.8)	4 (%) (1.0)	11 (%) (0.9)		11 (%) (0.9)
自殺/拒否	11 (%) (1.3)	1 (%) (0.2)	12 (%) (0.9)		12 (%) (0.9)
腸閉塞	3 (%) (0.4)	6 (%) (1.4)	9 (%) (0.7)		9 (%) (0.7)
肺血栓/肺塞栓	1 (%) (0.1)		1 (%) (0.1)		1 (%) (0.1)
災害・事故死	7 (%) (0.8)	2 (%) (0.5)	9 (%) (0.7)		9 (%) (0.7)
その他	80 (%) (9.3)	44 (%) (10.6)	124 (%) (9.8)		124 (%) (9.8)
不明	118 (%) (13.8)	40 (%) (9.7)	158 (%) (12.4)		158 (%) (12.4)
合計	856 (%) (100.0)	414 (%) (100.0)	1,270 (%) (100.0)		1,270 (%) (100.0)
記載なし					
総計	856	414	1,270		1,270

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査