

表 264 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(東京都)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	385	213	598		598
(%)	(21.4)	(25.0)	(22.6)		(22.6)
脳血管障害	101	45	146		146
(%)	(5.6)	(5.3)	(5.5)		(5.5)
感染症	401	174	575		575
(%)	(22.3)	(20.4)	(21.7)		(21.7)
消化管出血	33	15	48		48
(%)	(1.8)	(1.8)	(1.8)		(1.8)
悪性腫瘍	203	62	265		265
(%)	(11.3)	(7.3)	(10.0)		(10.0)
悪液質/尿毒症	50	48	98		98
(%)	(2.8)	(5.6)	(3.7)		(3.7)
心筋梗塞	73	39	112		112
(%)	(4.1)	(4.6)	(4.2)		(4.2)
カリウム中毒/頓死	83	27	110		110
(%)	(4.6)	(3.2)	(4.1)		(4.1)
肝硬変症	18	4	22		22
(%)	(1.0)	(0.5)	(0.8)		(0.8)
自殺/拒否	14	7	21		21
(%)	(0.8)	(0.8)	(0.8)		(0.8)
腸閉塞	16	9	25		25
(%)	(0.9)	(1.1)	(0.9)		(0.9)
肺血栓/肺塞栓	7	1	8		8
(%)	(0.4)	(0.1)	(0.3)		(0.3)
災害・事故死	6	2	8		8
(%)	(0.3)	(0.2)	(0.3)		(0.3)
その他	146	78	224		224
(%)	(8.1)	(9.1)	(8.4)		(8.4)
不明	262	129	391		391
(%)	(14.6)	(15.1)	(14.7)		(14.7)
合計	1,798	853	2,651		2,651
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	1,798	853	2,651		2,651

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査