

表 265 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(神奈川県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	249	133	382		382
(%)	(22.9)	(25.6)	(23.8)		(23.8)
脳血管障害	63	33	96		96
(%)	(5.8)	(6.4)	(6.0)		(6.0)
感染症	225	99	324		324
(%)	(20.7)	(19.1)	(20.2)		(20.2)
消化管出血	12	8	20		20
(%)	(1.1)	(1.5)	(1.2)		(1.2)
悪性腫瘍	129	43	172		172
(%)	(11.9)	(8.3)	(10.7)		(10.7)
悪液質/尿毒症	44	32	76		76
(%)	(4.0)	(6.2)	(4.7)		(4.7)
心筋梗塞	48	15	63		63
(%)	(4.4)	(2.9)	(3.9)		(3.9)
カリウム中毒/頓死	34	15	49		49
(%)	(3.1)	(2.9)	(3.1)		(3.1)
肝硬変症	12	4	16		16
(%)	(1.1)	(0.8)	(1.0)		(1.0)
自殺/拒否	5	5	10		10
(%)	(0.5)	(1.0)	(0.6)		(0.6)
腸閉塞	10	6	16		16
(%)	(0.9)	(1.2)	(1.0)		(1.0)
肺血栓/肺塞栓		3	3		3
(%)		(0.6)	(0.2)		(0.2)
災害・事故死	5	1	6		6
(%)	(0.5)	(0.2)	(0.4)		(0.4)
その他	86	60	146		146
(%)	(7.9)	(11.6)	(9.1)		(9.1)
不明	165	62	227		227
(%)	(15.2)	(11.9)	(14.1)		(14.1)
合計	1,087	519	1,606		1,606
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	1,087	519	1,606		1,606

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査