

表 267 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(富山県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	35 (%)	27 (30.7)	62 (23.0)		62 (23.0)
脳血管障害	19 (%)	5 (5.7)	24 (8.9)		24 (8.9)
感染症	45 (%)	17 (19.3)	62 (23.0)		62 (23.0)
消化管出血	8 (%)	3 (4.4)	11 (4.1)		11 (4.1)
悪性腫瘍	18 (%)	9 (9.9)	27 (10.0)		27 (10.0)
悪液質/尿毒症	8 (%)	3 (4.4)	11 (4.1)		11 (4.1)
心筋梗塞	5 (%)	5 (2.8)	10 (3.7)		10 (3.7)
カリウム中毒/頓死	7 (%)		7 (2.6)		7 (2.6)
肝硬変症	2 (%)	1 (1.1)	3 (1.1)		3 (1.1)
自殺/拒否	2 (%)	1 (1.1)	3 (1.1)		3 (1.1)
腸閉塞	1 (%)		1 (0.4)		1 (0.4)
肺血栓/肺塞栓					
災害・事故死	2 (%)	2 (2.3)	4 (1.5)		4 (1.5)
その他	17 (%)	7 (8.0)	24 (8.9)		24 (8.9)
不明	12 (%)	8 (9.1)	20 (7.4)		20 (7.4)
合計	181 (%)	88 (100.0)	269 (100.0)		269 (100.0)
記載なし					
総計	181	88	269		269

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査