

表 269 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(福井県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	28	9	37		37
(%)	(25.7)	(13.8)	(21.3)		(21.3)
脳血管障害	8	6	14		14
(%)	(7.3)	(9.2)	(8.0)		(8.0)
感染症	25	16	41		41
(%)	(22.9)	(24.6)	(23.6)		(23.6)
消化管出血					
(%)					
悪性腫瘍	16	5	21		21
(%)	(14.7)	(7.7)	(12.1)		(12.1)
悪液質/尿毒症	2	9	11		11
(%)	(1.8)	(13.8)	(6.3)		(6.3)
心筋梗塞	6	4	10		10
(%)	(5.5)	(6.2)	(5.7)		(5.7)
カリウム中毒/頓死	2	1	3		3
(%)	(1.8)	(1.5)	(1.7)		(1.7)
肝硬変症	4	1	5		5
(%)	(3.7)	(1.5)	(2.9)		(2.9)
自殺/拒否	1		1		1
(%)	(0.9)		(0.6)		(0.6)
腸閉塞	1		1		1
(%)	(0.9)		(0.6)		(0.6)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	2	1	3		3
(%)	(1.8)	(1.5)	(1.7)		(1.7)
その他	8	11	19		19
(%)	(7.3)	(16.9)	(10.9)		(10.9)
不明	6	2	8		8
(%)	(5.5)	(3.1)	(4.6)		(4.6)
合計	109	65	174		174
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	109	65	174		174

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査