

表 270 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(山梨県)

| 死因 | 男性 | 女性 | 合計 | 記載なし | 総計 |
|-----------|---------|---------|---------|------|---------|
| 心不全 | 53 | 31 | 84 | | 84 |
| (%) | (31.0) | (37.8) | (33.2) | | (33.2) |
| 脳血管障害 | 14 | 4 | 18 | | 18 |
| (%) | (8.2) | (4.9) | (7.1) | | (7.1) |
| 感染症 | 38 | 12 | 50 | | 50 |
| (%) | (22.2) | (14.6) | (19.8) | | (19.8) |
| 消化管出血 | 4 | 3 | 7 | | 7 |
| (%) | (2.3) | (3.7) | (2.8) | | (2.8) |
| 悪性腫瘍 | 18 | 10 | 28 | | 28 |
| (%) | (10.5) | (12.2) | (11.1) | | (11.1) |
| 悪液質/尿毒症 | 6 | 2 | 8 | | 8 |
| (%) | (3.5) | (2.4) | (3.2) | | (3.2) |
| 心筋梗塞 | 5 | 2 | 7 | | 7 |
| (%) | (2.9) | (2.4) | (2.8) | | (2.8) |
| カリウム中毒/頓死 | 7 | 1 | 8 | | 8 |
| (%) | (4.1) | (1.2) | (3.2) | | (3.2) |
| 肝硬変症 | 5 | | 5 | | 5 |
| (%) | (2.9) | | (2.0) | | (2.0) |
| 自殺/拒否 | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| (%) | (0.6) | (1.2) | (0.8) | | (0.8) |
| 腸閉塞 | 2 | | 2 | | 2 |
| (%) | (1.2) | | (0.8) | | (0.8) |
| 肺血栓/肺塞栓 | | | | | |
| (%) | | | | | |
| 災害・事故死 | 1 | | 1 | | 1 |
| (%) | (0.6) | | (0.4) | | (0.4) |
| その他 | 7 | 4 | 11 | | 11 |
| (%) | (4.1) | (4.9) | (4.3) | | (4.3) |
| 不明 | 10 | 12 | 22 | | 22 |
| (%) | (5.8) | (14.6) | (8.7) | | (8.7) |
| 合計 | 171 | 82 | 253 | | 253 |
| (%) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | | (100.0) |
| 記載なし | | | | | |
| 総計 | 171 | 82 | 253 | | 253 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査