

表 271 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(長野県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	78 (%) (28.8)	43 (%) (30.1)	121 (%) (29.2)		121 (%) (29.2)
脳血管障害	20 (%) (7.4)	17 (%) (11.9)	37 (%) (8.9)		37 (%) (8.9)
感染症	52 (%) (19.2)	31 (%) (21.7)	83 (%) (20.0)		83 (%) (20.0)
消化管出血	2 (%) (0.7)	1 (%) (0.7)	3 (%) (0.7)		3 (%) (0.7)
悪性腫瘍	27 (%) (10.0)	16 (%) (11.2)	43 (%) (10.4)		43 (%) (10.4)
悪液質/尿毒症	11 (%) (4.1)	5 (%) (3.5)	16 (%) (3.9)		16 (%) (3.9)
心筋梗塞	16 (%) (5.9)	5 (%) (3.5)	21 (%) (5.1)		21 (%) (5.1)
カリウム中毒/頓死	11 (%) (4.1)	1 (%) (0.7)	12 (%) (2.9)		12 (%) (2.9)
肝硬変症	2 (%) (0.7)		2 (%) (0.5)		2 (%) (0.5)
自殺/拒否					
腸閉塞					
肺血栓/肺塞栓		1 (%) (0.7)	1 (%) (0.2)		1 (%) (0.2)
災害・事故死	3 (%) (1.1)	2 (%) (1.4)	5 (%) (1.2)		5 (%) (1.2)
その他	38 (%) (14.0)	16 (%) (11.2)	54 (%) (13.0)		54 (%) (13.0)
不明	11 (%) (4.1)	5 (%) (3.5)	16 (%) (3.9)		16 (%) (3.9)
合計	271 (%) (100.0)	143 (%) (100.0)	414 (%) (100.0)		414 (%) (100.0)
記載なし					
総計	271	143	414		414

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査