

表 272 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(岐阜県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	97	49	146		146
(%)	(29.8)	(28.2)	(29.3)		(29.3)
脳血管障害	25	12	37		37
(%)	(7.7)	(6.9)	(7.4)		(7.4)
感染症	50	34	84		84
(%)	(15.4)	(19.5)	(16.8)		(16.8)
消化管出血	3		3		3
(%)	(0.9)		(0.6)		(0.6)
悪性腫瘍	37	11	48		48
(%)	(11.4)	(6.3)	(9.6)		(9.6)
悪液質/尿毒症	21	19	40		40
(%)	(6.5)	(10.9)	(8.0)		(8.0)
心筋梗塞	6	7	13		13
(%)	(1.8)	(4.0)	(2.6)		(2.6)
カリウム中毒/頓死	12	4	16		16
(%)	(3.7)	(2.3)	(3.2)		(3.2)
肝硬変症		1	1		1
(%)		(0.6)	(0.2)		(0.2)
自殺/拒否	4	2	6		6
(%)	(1.2)	(1.1)	(1.2)		(1.2)
腸閉塞	3	2	5		5
(%)	(0.9)	(1.1)	(1.0)		(1.0)
肺血栓/肺塞栓	2	3	5		5
(%)	(0.6)	(1.7)	(1.0)		(1.0)
災害・事故死	2	1	3		3
(%)	(0.6)	(0.6)	(0.6)		(0.6)
その他	29	14	43		43
(%)	(8.9)	(8.0)	(8.6)		(8.6)
不明	34	15	49		49
(%)	(10.5)	(8.6)	(9.8)		(9.8)
合計	325	174	499		499
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	325	174	499		499

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査