

表 273 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(静岡県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	130	80	210		210
(%)	(22.4)	(30.0)	(24.8)		(24.8)
脳血管障害	34	18	52		52
(%)	(5.9)	(6.7)	(6.1)		(6.1)
感染症	139	55	194		194
(%)	(23.9)	(20.6)	(22.9)		(22.9)
消化管出血	12	3	15		15
(%)	(2.1)	(1.1)	(1.8)		(1.8)
悪性腫瘍	51	14	65		65
(%)	(8.8)	(5.2)	(7.7)		(7.7)
悪液質/尿毒症	27	21	48		48
(%)	(4.6)	(7.9)	(5.7)		(5.7)
心筋梗塞	35	9	44		44
(%)	(6.0)	(3.4)	(5.2)		(5.2)
カリウム中毒/頓死	13	5	18		18
(%)	(2.2)	(1.9)	(2.1)		(2.1)
肝硬変症	10		10		10
(%)	(1.7)		(1.2)		(1.2)
自殺/拒否	5	1	6		6
(%)	(0.9)	(0.4)	(0.7)		(0.7)
腸閉塞	6	3	9		9
(%)	(1.0)	(1.1)	(1.1)		(1.1)
肺血栓/肺塞栓	5		5		5
(%)	(0.9)		(0.6)		(0.6)
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.2)		(0.1)		(0.1)
その他	52	32	84		84
(%)	(9.0)	(12.0)	(9.9)		(9.9)
不明	61	26	87		87
(%)	(10.5)	(9.7)	(10.3)		(10.3)
合計	581	267	848		848
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	581	267	848		848

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査