

表 274 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(愛知県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	182	109	291		291
(%)	(19.3)	(21.8)	(20.2)		(20.2)
脳血管障害	62	35	97		97
(%)	(6.6)	(7.0)	(6.7)		(6.7)
感染症	212	124	336		336
(%)	(22.5)	(24.8)	(23.3)		(23.3)
消化管出血	12	10	22		22
(%)	(1.3)	(2.0)	(1.5)		(1.5)
悪性腫瘍	106	40	146		146
(%)	(11.3)	(8.0)	(10.1)		(10.1)
悪液質/尿毒症	28	17	45		45
(%)	(3.0)	(3.4)	(3.1)		(3.1)
心筋梗塞	49	14	63		63
(%)	(5.2)	(2.8)	(4.4)		(4.4)
カリウム中毒/頓死	13	6	19		19
(%)	(1.4)	(1.2)	(1.3)		(1.3)
肝硬変症	9		9		9
(%)	(1.0)		(0.6)		(0.6)
自殺/拒否	4	6	10		10
(%)	(0.4)	(1.2)	(0.7)		(0.7)
腸閉塞	7	7	14		14
(%)	(0.7)	(1.4)	(1.0)		(1.0)
肺血栓/肺塞栓	4	2	6		6
(%)	(0.4)	(0.4)	(0.4)		(0.4)
災害・事故死	2		2		2
(%)	(0.2)		(0.1)		(0.1)
その他	92	62	154		154
(%)	(9.8)	(12.4)	(10.7)		(10.7)
不明	159	69	228		228
(%)	(16.9)	(13.8)	(15.8)		(15.8)
合計	941	501	1,442		1,442
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	941	501	1,442		1,442

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査