

表 275 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(三重県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	53	37	90		90
(%)	(19.2)	(26.1)	(21.5)		(21.5)
脳血管障害	17	14	31		31
(%)	(6.2)	(9.9)	(7.4)		(7.4)
感染症	63	27	90		90
(%)	(22.8)	(19.0)	(21.5)		(21.5)
消化管出血	5	3	8		8
(%)	(1.8)	(2.1)	(1.9)		(1.9)
悪性腫瘍	30	3	33		33
(%)	(10.9)	(2.1)	(7.9)		(7.9)
悪液質/尿毒症	14	8	22		22
(%)	(5.1)	(5.6)	(5.3)		(5.3)
心筋梗塞	15	5	20		20
(%)	(5.4)	(3.5)	(4.8)		(4.8)
カリウム中毒/頓死	9	3	12		12
(%)	(3.3)	(2.1)	(2.9)		(2.9)
肝硬変症	7	1	8		8
(%)	(2.5)	(0.7)	(1.9)		(1.9)
自殺/拒否	3		3		3
(%)	(1.1)		(0.7)		(0.7)
腸閉塞	3		3		3
(%)	(1.1)		(0.7)		(0.7)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	1	1	2		2
(%)	(0.4)	(0.7)	(0.5)		(0.5)
その他	21	17	38		38
(%)	(7.6)	(12.0)	(9.1)		(9.1)
不明	35	23	58		58
(%)	(12.7)	(16.2)	(13.9)		(13.9)
合計	276	142	418		418
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	276	142	418		418

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査