

表 276 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(滋賀県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	51	36	87		87
(%)	(24.5)	(36.7)	(28.4)		(28.4)
脳血管障害	8	6	14		14
(%)	(3.8)	(6.1)	(4.6)		(4.6)
感染症	40	18	58		58
(%)	(19.2)	(18.4)	(19.0)		(19.0)
消化管出血	1	2	3		3
(%)	(0.5)	(2.0)	(1.0)		(1.0)
悪性腫瘍	24	5	29		29
(%)	(11.5)	(5.1)	(9.5)		(9.5)
悪液質/尿毒症	8	1	9		9
(%)	(3.8)	(1.0)	(2.9)		(2.9)
心筋梗塞	10	2	12		12
(%)	(4.8)	(2.0)	(3.9)		(3.9)
カリウム中毒/頓死	4	1	5		5
(%)	(1.9)	(1.0)	(1.6)		(1.6)
肝硬変症	4	1	5		5
(%)	(1.9)	(1.0)	(1.6)		(1.6)
自殺/拒否					
(%)					
腸閉塞		3	3		3
(%)		(3.1)	(1.0)		(1.0)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.5)		(0.3)		(0.3)
災害・事故死	2		2		2
(%)	(1.0)		(0.7)		(0.7)
その他	27	13	40		40
(%)	(13.0)	(13.3)	(13.1)		(13.1)
不明	28	10	38		38
(%)	(13.5)	(10.2)	(12.4)		(12.4)
合計	208	98	306		306
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	208	98	306		306

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査