

表 277 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(京都府)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	133 (%) (33.1)	66 (%) (33.7)	199 (%) (33.3)		199 (%) (33.3)
脳血管障害	18 (%) (4.5)	8 (%) (4.1)	26 (%) (4.3)		26 (%) (4.3)
感染症	95 (%) (23.6)	36 (%) (18.4)	131 (%) (21.9)		131 (%) (21.9)
消化管出血	4 (%) (1.0)	1 (%) (0.5)	5 (%) (0.8)		5 (%) (0.8)
悪性腫瘍	43 (%) (10.7)	24 (%) (12.2)	67 (%) (11.2)		67 (%) (11.2)
悪液質/尿毒症	5 (%) (1.2)	6 (%) (3.1)	11 (%) (1.8)		11 (%) (1.8)
心筋梗塞	18 (%) (4.5)	4 (%) (2.0)	22 (%) (3.7)		22 (%) (3.7)
カリウム中毒/頓死	13 (%) (3.2)	8 (%) (4.1)	21 (%) (3.5)		21 (%) (3.5)
肝硬変症	4 (%) (1.0)	2 (%) (1.0)	6 (%) (1.0)		6 (%) (1.0)
自殺/拒否	3 (%) (0.7)		3 (%) (0.5)		3 (%) (0.5)
腸閉塞	7 (%) (1.7)	4 (%) (2.0)	11 (%) (1.8)		11 (%) (1.8)
肺血栓/肺塞栓	3 (%) (0.7)	1 (%) (0.5)	4 (%) (0.7)		4 (%) (0.7)
災害・事故死	2 (%) (0.5)		2 (%) (0.3)		2 (%) (0.3)
その他	34 (%) (8.5)	23 (%) (11.7)	57 (%) (9.5)		57 (%) (9.5)
不明	20 (%) (5.0)	13 (%) (6.6)	33 (%) (5.5)		33 (%) (5.5)
合計	402 (%) (100.0)	196 (%) (100.0)	598 (%) (100.0)		598 (%) (100.0)
記載なし					
総計	402	196	598		598

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査