

表 278 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(大阪府)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	314	199	513		513
(%)	(22.3)	(24.6)	(23.1)		(23.1)
脳血管障害	86	59	145		145
(%)	(6.1)	(7.3)	(6.5)		(6.5)
感染症	388	210	598		598
(%)	(27.6)	(26.0)	(27.0)		(27.0)
消化管出血	26	10	36		36
(%)	(1.8)	(1.2)	(1.6)		(1.6)
悪性腫瘍	158	45	203		203
(%)	(11.2)	(5.6)	(9.2)		(9.2)
悪液質/尿毒症	37	37	74		74
(%)	(2.6)	(4.6)	(3.3)		(3.3)
心筋梗塞	43	26	69		69
(%)	(3.1)	(3.2)	(3.1)		(3.1)
カリウム中毒/頓死	35	17	52		52
(%)	(2.5)	(2.1)	(2.3)		(2.3)
肝硬変症	18	5	23		23
(%)	(1.3)	(0.6)	(1.0)		(1.0)
自殺/拒否	12	5	17		17
(%)	(0.9)	(0.6)	(0.8)		(0.8)
腸閉塞	13	12	25		25
(%)	(0.9)	(1.5)	(1.1)		(1.1)
肺血栓/肺塞栓	6	6	12		12
(%)	(0.4)	(0.7)	(0.5)		(0.5)
災害・事故死	5	2	7		7
(%)	(0.4)	(0.2)	(0.3)		(0.3)
その他	127	107	234		234
(%)	(9.0)	(13.2)	(10.6)		(10.6)
不明	140	69	209		209
(%)	(9.9)	(8.5)	(9.4)		(9.4)
合計	1,408	809	2,217		2,217
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし	3	4	7		7
総計	1,411	813	2,224		2,224

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査