

表 279 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(兵庫県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	248	133	381		381
(%)	(32.3)	(31.6)	(32.0)		(32.0)
脳血管障害	44	32	76		76
(%)	(5.7)	(7.6)	(6.4)		(6.4)
感染症	163	109	272		272
(%)	(21.2)	(25.9)	(22.9)		(22.9)
消化管出血	11	7	18		18
(%)	(1.4)	(1.7)	(1.5)		(1.5)
悪性腫瘍	75	32	107		107
(%)	(9.8)	(7.6)	(9.0)		(9.0)
悪液質/尿毒症	26	16	42		42
(%)	(3.4)	(3.8)	(3.5)		(3.5)
心筋梗塞	25	7	32		32
(%)	(3.3)	(1.7)	(2.7)		(2.7)
カリウム中毒/頓死	21	8	29		29
(%)	(2.7)	(1.9)	(2.4)		(2.4)
肝硬変症	7	4	11		11
(%)	(0.9)	(1.0)	(0.9)		(0.9)
自殺/拒否	5	3	8		8
(%)	(0.7)	(0.7)	(0.7)		(0.7)
腸閉塞	16	5	21		21
(%)	(2.1)	(1.2)	(1.8)		(1.8)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.1)		(0.1)		(0.1)
災害・事故死	5	1	6		6
(%)	(0.7)	(0.2)	(0.5)		(0.5)
その他	40	25	65		65
(%)	(5.2)	(5.9)	(5.5)		(5.5)
不明	81	39	120		120
(%)	(10.5)	(9.3)	(10.1)		(10.1)
合計	768	421	1,189		1,189
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	768	421	1,189		1,189

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査