

表 280 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(奈良県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	54	44	98		98
(%)	(27.7)	(40.4)	(32.2)		(32.2)
脳血管障害	10	10	20		20
(%)	(5.1)	(9.2)	(6.6)		(6.6)
感染症	42	23	65		65
(%)	(21.5)	(21.1)	(21.4)		(21.4)
消化管出血		4	4		4
(%)		(3.7)	(1.3)		(1.3)
悪性腫瘍	22	5	27		27
(%)	(11.3)	(4.6)	(8.9)		(8.9)
悪液質/尿毒症	6	2	8		8
(%)	(3.1)	(1.8)	(2.6)		(2.6)
心筋梗塞	10	7	17		17
(%)	(5.1)	(6.4)	(5.6)		(5.6)
カリウム中毒/頓死	4	2	6		6
(%)	(2.1)	(1.8)	(2.0)		(2.0)
肝硬変症	4	2	6		6
(%)	(2.1)	(1.8)	(2.0)		(2.0)
自殺/拒否	3		3		3
(%)	(1.5)		(1.0)		(1.0)
腸閉塞	2	2	4		4
(%)	(1.0)	(1.8)	(1.3)		(1.3)
肺血栓/肺塞栓	1		1		1
(%)	(0.5)		(0.3)		(0.3)
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.5)		(0.3)		(0.3)
その他	15	5	20		20
(%)	(7.7)	(4.6)	(6.6)		(6.6)
不明	21	3	24		24
(%)	(10.8)	(2.8)	(7.9)		(7.9)
合計	195	109	304		304
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	195	109	304		304

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査