

表 281 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(和歌山県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	59	39	98		98
(%)	(34.7)	(39.0)	(36.3)		(36.3)
脳血管障害	10	5	15		15
(%)	(5.9)	(5.0)	(5.6)		(5.6)
感染症	36	14	50		50
(%)	(21.2)	(14.0)	(18.5)		(18.5)
消化管出血					
(%)					
悪性腫瘍	23	12	35		35
(%)	(13.5)	(12.0)	(13.0)		(13.0)
悪液質/尿毒症	6	8	14		14
(%)	(3.5)	(8.0)	(5.2)		(5.2)
心筋梗塞	5	4	9		9
(%)	(2.9)	(4.0)	(3.3)		(3.3)
カリウム中毒/頓死	1	1	2		2
(%)	(0.6)	(1.0)	(0.7)		(0.7)
肝硬変症	2		2		2
(%)	(1.2)		(0.7)		(0.7)
自殺/拒否	1	1	2		2
(%)	(0.6)	(1.0)	(0.7)		(0.7)
腸閉塞		2	2		2
(%)		(2.0)	(0.7)		(0.7)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	5	1	6		6
(%)	(2.9)	(1.0)	(2.2)		(2.2)
その他	8	2	10		10
(%)	(4.7)	(2.0)	(3.7)		(3.7)
不明	14	11	25		25
(%)	(8.2)	(11.0)	(9.3)		(9.3)
合計	170	100	270		270
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	170	100	270		270

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査