

表 283 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(島根県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	28 (%) (24.8)	12 (%) (22.6)	40 (%) (24.1)		40 (%) (24.1)
脳血管障害	11 (%) (9.7)	4 (%) (7.5)	15 (%) (9.0)		15 (%) (9.0)
感染症	32 (%) (28.3)	10 (%) (18.9)	42 (%) (25.3)		42 (%) (25.3)
消化管出血	3 (%) (2.7)		3 (%) (1.8)		3 (%) (1.8)
悪性腫瘍	13 (%) (11.5)	6 (%) (11.3)	19 (%) (11.4)		19 (%) (11.4)
悪液質/尿毒症	5 (%) (4.4)	3 (%) (5.7)	8 (%) (4.8)		8 (%) (4.8)
心筋梗塞	2 (%) (1.8)	5 (%) (9.4)	7 (%) (4.2)		7 (%) (4.2)
カリウム中毒/頓死	3 (%) (2.7)	1 (%) (1.9)	4 (%) (2.4)		4 (%) (2.4)
肝硬変症					
自殺/拒否	2 (%) (1.8)	1 (%) (1.9)	3 (%) (1.8)		3 (%) (1.8)
腸閉塞					
肺血栓/肺塞栓					
災害・事故死	2 (%) (1.8)		2 (%) (1.2)		2 (%) (1.2)
その他	7 (%) (6.2)	7 (%) (13.2)	14 (%) (8.4)		14 (%) (8.4)
不明	5 (%) (4.4)	4 (%) (7.5)	9 (%) (5.4)		9 (%) (5.4)
合計	113 (%) (100.0)	53 (%) (100.0)	166 (%) (100.0)		166 (%) (100.0)
記載なし					
総計	113	53	166		166

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査