

表 284 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(岡山県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	59 (%) (18.5)	56 (%) (32.4)	115 (%) (23.4)		115 (%) (23.4)
脳血管障害	24 (%) (7.5)	8 (%) (4.6)	32 (%) (6.5)		32 (%) (6.5)
感染症	103 (%) (32.3)	37 (%) (21.4)	140 (%) (28.5)		140 (%) (28.5)
消化管出血	8 (%) (2.5)	3 (%) (1.7)	11 (%) (2.2)		11 (%) (2.2)
悪性腫瘍	40 (%) (12.5)	15 (%) (8.7)	55 (%) (11.2)		55 (%) (11.2)
悪液質/尿毒症	14 (%) (4.4)	11 (%) (6.4)	25 (%) (5.1)		25 (%) (5.1)
心筋梗塞	13 (%) (4.1)	5 (%) (2.9)	18 (%) (3.7)		18 (%) (3.7)
カリウム中毒/頓死	10 (%) (3.1)	1 (%) (0.6)	11 (%) (2.2)		11 (%) (2.2)
肝硬変症	2 (%) (0.6)	1 (%) (0.6)	3 (%) (0.6)		3 (%) (0.6)
自殺/拒否	2 (%) (0.6)		2 (%) (0.4)		2 (%) (0.4)
腸閉塞	5 (%) (1.6)	1 (%) (0.6)	6 (%) (1.2)		6 (%) (1.2)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	2 (%) (0.6)	3 (%) (1.7)	5 (%) (1.0)		5 (%) (1.0)
その他	22 (%) (6.9)	22 (%) (12.7)	44 (%) (8.9)		44 (%) (8.9)
不明	15 (%) (4.7)	10 (%) (5.8)	25 (%) (5.1)		25 (%) (5.1)
合計	319 (%) (100.0)	173 (%) (100.0)	492 (%) (100.0)		492 (%) (100.0)
記載なし					
総計	319	173	492		492

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査