

表 285 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(広島県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	120	55	175		175
(%)	(24.0)	(20.8)	(22.9)		(22.9)
脳血管障害	29	15	44		44
(%)	(5.8)	(5.7)	(5.8)		(5.8)
感染症	127	67	194		194
(%)	(25.4)	(25.4)	(25.4)		(25.4)
消化管出血	13	5	18		18
(%)	(2.6)	(1.9)	(2.4)		(2.4)
悪性腫瘍	56	16	72		72
(%)	(11.2)	(6.1)	(9.4)		(9.4)
悪液質/尿毒症	28	27	55		55
(%)	(5.6)	(10.2)	(7.2)		(7.2)
心筋梗塞	27	13	40		40
(%)	(5.4)	(4.9)	(5.2)		(5.2)
カリウム中毒/頓死	11	7	18		18
(%)	(2.2)	(2.7)	(2.4)		(2.4)
肝硬変症	8	2	10		10
(%)	(1.6)	(0.8)	(1.3)		(1.3)
自殺/拒否	2	2	4		4
(%)	(0.4)	(0.8)	(0.5)		(0.5)
腸閉塞	6	4	10		10
(%)	(1.2)	(1.5)	(1.3)		(1.3)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	1	1	2		2
(%)	(0.2)	(0.4)	(0.3)		(0.3)
その他	37	37	74		74
(%)	(7.4)	(14.0)	(9.7)		(9.7)
不明	35	13	48		48
(%)	(7.0)	(4.9)	(6.3)		(6.3)
合計	500	264	764		764
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	500	264	764		764

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査