

表 287 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(徳島県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	47 (%) (26.4)	40 (%) (43.0)	87 (%) (32.1)		87 (%) (32.1)
脳血管障害	15 (%) (8.4)	1 (%) (1.1)	16 (%) (5.9)		16 (%) (5.9)
感染症	45 (%) (25.3)	23 (%) (24.7)	68 (%) (25.1)		68 (%) (25.1)
消化管出血	1 (%) (0.6)	1 (%) (1.1)	2 (%) (0.7)		2 (%) (0.7)
悪性腫瘍	21 (%) (11.8)	6 (%) (6.5)	27 (%) (10.0)		27 (%) (10.0)
悪液質/尿毒症	3 (%) (1.7)	2 (%) (2.2)	5 (%) (1.8)		5 (%) (1.8)
心筋梗塞	5 (%) (2.8)	2 (%) (2.2)	7 (%) (2.6)		7 (%) (2.6)
カリウム中毒/頓死	8 (%) (4.5)	5 (%) (5.4)	13 (%) (4.8)		13 (%) (4.8)
肝硬変症		2 (%) (2.2)	2 (%) (0.7)		2 (%) (0.7)
自殺/拒否					
腸閉塞	6 (%) (3.4)		6 (%) (2.2)		6 (%) (2.2)
肺血栓/肺塞栓	2 (%) (1.1)		2 (%) (0.7)		2 (%) (0.7)
災害・事故死		1 (%) (1.1)	1 (%) (0.4)		1 (%) (0.4)
その他	13 (%) (7.3)	7 (%) (7.5)	20 (%) (7.4)		20 (%) (7.4)
不明	12 (%) (6.7)	3 (%) (3.2)	15 (%) (5.5)		15 (%) (5.5)
合計	178 (%) (100.0)	93 (%) (100.0)	271 (%) (100.0)		271 (%) (100.0)
記載なし					
総計	178	93	271		271

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査