

表 288 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(香川県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	63 (%) (36.4)	38 (36.2)	101 (36.3)		101 (36.3)
脳血管障害	10 (%) (5.8)	9 (8.6)	19 (6.8)		19 (6.8)
感染症	42 (%) (24.3)	24 (22.9)	66 (23.7)		66 (23.7)
消化管出血	2 (%) (1.2)		2 (0.7)		2 (0.7)
悪性腫瘍	17 (%) (9.8)	7 (6.7)	24 (8.6)		24 (8.6)
悪液質/尿毒症	10 (%) (5.8)	2 (1.9)	12 (4.3)		12 (4.3)
心筋梗塞	10 (%) (5.8)	4 (3.8)	14 (5.0)		14 (5.0)
カリウム中毒/頓死	6 (%) (3.5)	2 (1.9)	8 (2.9)		8 (2.9)
肝硬変症	1 (%) (0.6)		1 (0.4)		1 (0.4)
自殺/拒否		1 (1.0)	1 (0.4)		1 (0.4)
腸閉塞		2 (1.9)	2 (0.7)		2 (0.7)
肺血栓/肺塞栓		1 (1.0)	1 (0.4)		1 (0.4)
災害・事故死					
その他	10 (%) (5.8)	11 (10.5)	21 (7.6)		21 (7.6)
不明	2 (%) (1.2)	4 (3.8)	6 (2.2)		6 (2.2)
合計	173 (%) (100.0)	105 (100.0)	278 (100.0)		278 (100.0)
記載なし					
総計	173	105	278		278

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査