

表 289 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(愛媛県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	64	45	109		109
(%)	(24.6)	(34.1)	(27.8)		(27.8)
脳血管障害	19	10	29		29
(%)	(7.3)	(7.6)	(7.4)		(7.4)
感染症	61	24	85		85
(%)	(23.5)	(18.2)	(21.7)		(21.7)
消化管出血	4	3	7		7
(%)	(1.5)	(2.3)	(1.8)		(1.8)
悪性腫瘍	22	4	26		26
(%)	(8.5)	(3.0)	(6.6)		(6.6)
悪液質/尿毒症	17	10	27		27
(%)	(6.5)	(7.6)	(6.9)		(6.9)
心筋梗塞	7	1	8		8
(%)	(2.7)	(0.8)	(2.0)		(2.0)
カリウム中毒/頓死	6	3	9		9
(%)	(2.3)	(2.3)	(2.3)		(2.3)
肝硬変症	2	1	3		3
(%)	(0.8)	(0.8)	(0.8)		(0.8)
自殺/拒否	5	3	8		8
(%)	(1.9)	(2.3)	(2.0)		(2.0)
腸閉塞	2	4	6		6
(%)	(0.8)	(3.0)	(1.5)		(1.5)
肺血栓/肺塞栓	1	1	2		2
(%)	(0.4)	(0.8)	(0.5)		(0.5)
災害・事故死	2		2		2
(%)	(0.8)		(0.5)		(0.5)
その他	29	16	45		45
(%)	(11.2)	(12.1)	(11.5)		(11.5)
不明	19	7	26		26
(%)	(7.3)	(5.3)	(6.6)		(6.6)
合計	260	132	392		392
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	260	132	392		392

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査