

表 290 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(高知県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	32	18	50		50
(%)	(20.1)	(26.5)	(22.0)		(22.0)
脳血管障害	12	6	18		18
(%)	(7.5)	(8.8)	(7.9)		(7.9)
感染症	45	19	64		64
(%)	(28.3)	(27.9)	(28.2)		(28.2)
消化管出血	2	2	4		4
(%)	(1.3)	(2.9)	(1.8)		(1.8)
悪性腫瘍	24	8	32		32
(%)	(15.1)	(11.8)	(14.1)		(14.1)
悪液質/尿毒症	5	5	10		10
(%)	(3.1)	(7.4)	(4.4)		(4.4)
心筋梗塞	9	2	11		11
(%)	(5.7)	(2.9)	(4.8)		(4.8)
カリウム中毒/頓死	3		3		3
(%)	(1.9)		(1.3)		(1.3)
肝硬変症	1		1		1
(%)	(0.6)		(0.4)		(0.4)
自殺/拒否	2		2		2
(%)	(1.3)		(0.9)		(0.9)
腸閉塞	6	1	7		7
(%)	(3.8)	(1.5)	(3.1)		(3.1)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死					
(%)					
その他	10	6	16		16
(%)	(6.3)	(8.8)	(7.0)		(7.0)
不明	8	1	9		9
(%)	(5.0)	(1.5)	(4.0)		(4.0)
合計	159	68	227		227
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	159	68	227		227

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査