

表 291 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(福岡県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	109	88	197		197
(%)	(14.7)	(21.6)	(17.2)		(17.2)
脳血管障害	41	33	74		74
(%)	(5.5)	(8.1)	(6.5)		(6.5)
感染症	230	111	341		341
(%)	(31.1)	(27.3)	(29.7)		(29.7)
消化管出血	17	3	20		20
(%)	(2.3)	(0.7)	(1.7)		(1.7)
悪性腫瘍	93	37	130		130
(%)	(12.6)	(9.1)	(11.3)		(11.3)
悪液質/尿毒症	27	23	50		50
(%)	(3.6)	(5.7)	(4.4)		(4.4)
心筋梗塞	33	19	52		52
(%)	(4.5)	(4.7)	(4.5)		(4.5)
カリウム中毒/頓死	24	6	30		30
(%)	(3.2)	(1.5)	(2.6)		(2.6)
肝硬変症	10	2	12		12
(%)	(1.4)	(0.5)	(1.0)		(1.0)
自殺/拒否	9		9		9
(%)	(1.2)		(0.8)		(0.8)
腸閉塞	13	9	22		22
(%)	(1.8)	(2.2)	(1.9)		(1.9)
肺血栓/肺塞栓	2		2		2
(%)	(0.3)		(0.2)		(0.2)
災害・事故死	5		5		5
(%)	(0.7)		(0.4)		(0.4)
その他	60	49	109		109
(%)	(8.1)	(12.0)	(9.5)		(9.5)
不明	67	27	94		94
(%)	(9.1)	(6.6)	(8.2)		(8.2)
合計	740	407	1,147		1,147
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし	8	10	18		18
総計	748	417	1,165		1,165

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査