

表 292 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(佐賀県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	26	28	54		54
(%)	(19.5)	(33.7)	(25.0)		(25.0)
脳血管障害	14	5	19		19
(%)	(10.5)	(6.0)	(8.8)		(8.8)
感染症	36	17	53		53
(%)	(27.1)	(20.5)	(24.5)		(24.5)
消化管出血	4		4		4
(%)	(3.0)		(1.9)		(1.9)
悪性腫瘍	14	12	26		26
(%)	(10.5)	(14.5)	(12.0)		(12.0)
悪液質/尿毒症	6	5	11		11
(%)	(4.5)	(6.0)	(5.1)		(5.1)
心筋梗塞	5	1	6		6
(%)	(3.8)	(1.2)	(2.8)		(2.8)
カリウム中毒/頓死	7		7		7
(%)	(5.3)		(3.2)		(3.2)
肝硬変症	1	2	3		3
(%)	(0.8)	(2.4)	(1.4)		(1.4)
自殺/拒否					
(%)					
腸閉塞	2		2		2
(%)	(1.5)		(0.9)		(0.9)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死					
(%)					
その他	10	7	17		17
(%)	(7.5)	(8.4)	(7.9)		(7.9)
不明	8	6	14		14
(%)	(6.0)	(7.2)	(6.5)		(6.5)
合計	133	83	216		216
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	133	83	216		216

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査