

表 293 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(長崎県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	48	32	80		80
(%)	(22.1)	(21.9)	(22.0)		(22.0)
脳血管障害	20	18	38		38
(%)	(9.2)	(12.3)	(10.5)		(10.5)
感染症	53	32	85		85
(%)	(24.4)	(21.9)	(23.4)		(23.4)
消化管出血	4	2	6		6
(%)	(1.8)	(1.4)	(1.7)		(1.7)
悪性腫瘍	26	8	34		34
(%)	(12.0)	(5.5)	(9.4)		(9.4)
悪液質/尿毒症	8	17	25		25
(%)	(3.7)	(11.6)	(6.9)		(6.9)
心筋梗塞	12	9	21		21
(%)	(5.5)	(6.2)	(5.8)		(5.8)
カリウム中毒/頓死	4	1	5		5
(%)	(1.8)	(0.7)	(1.4)		(1.4)
肝硬変症	2	1	3		3
(%)	(0.9)	(0.7)	(0.8)		(0.8)
自殺/拒否					
(%)					
腸閉塞	5	1	6		6
(%)	(2.3)	(0.7)	(1.7)		(1.7)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	1	1	2		2
(%)	(0.5)	(0.7)	(0.6)		(0.6)
その他	26	19	45		45
(%)	(12.0)	(13.0)	(12.4)		(12.4)
不明	8	5	13		13
(%)	(3.7)	(3.4)	(3.6)		(3.6)
合計	217	146	363		363
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	217	146	363		363

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査