

表 296 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(宮崎県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	50	29	79		79
(%)	(24.5)	(19.5)	(22.4)		(22.4)
脳血管障害	14	13	27		27
(%)	(6.9)	(8.7)	(7.6)		(7.6)
感染症	45	42	87		87
(%)	(22.1)	(28.2)	(24.6)		(24.6)
消化管出血	2	2	4		4
(%)	(1.0)	(1.3)	(1.1)		(1.1)
悪性腫瘍	27	12	39		39
(%)	(13.2)	(8.1)	(11.0)		(11.0)
悪液質/尿毒症	10	14	24		24
(%)	(4.9)	(9.4)	(6.8)		(6.8)
心筋梗塞	13	4	17		17
(%)	(6.4)	(2.7)	(4.8)		(4.8)
カリウム中毒/頓死	8	3	11		11
(%)	(3.9)	(2.0)	(3.1)		(3.1)
肝硬変症	4	4	8		8
(%)	(2.0)	(2.7)	(2.3)		(2.3)
自殺/拒否	1	2	3		3
(%)	(0.5)	(1.3)	(0.8)		(0.8)
腸閉塞	3	1	4		4
(%)	(1.5)	(0.7)	(1.1)		(1.1)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	1		1		1
(%)	(0.5)		(0.3)		(0.3)
その他	24	21	45		45
(%)	(11.8)	(14.1)	(12.7)		(12.7)
不明	2	2	4		4
(%)	(1.0)	(1.3)	(1.1)		(1.1)
合計	204	149	353		353
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	204	149	353		353

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査