

表 297 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(鹿児島県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	76	57	133		133
(%)	(28.1)	(27.9)	(28.1)		(28.1)
脳血管障害	14	12	26		26
(%)	(5.2)	(5.9)	(5.5)		(5.5)
感染症	61	38	99		99
(%)	(22.6)	(18.6)	(20.9)		(20.9)
消化管出血	6	5	11		11
(%)	(2.2)	(2.5)	(2.3)		(2.3)
悪性腫瘍	23	12	35		35
(%)	(8.5)	(5.9)	(7.4)		(7.4)
悪液質/尿毒症	14	18	32		32
(%)	(5.2)	(8.8)	(6.8)		(6.8)
心筋梗塞	14	7	21		21
(%)	(5.2)	(3.4)	(4.4)		(4.4)
カリウム中毒/頓死	3	4	7		7
(%)	(1.1)	(2.0)	(1.5)		(1.5)
肝硬変症	2	1	3		3
(%)	(0.7)	(0.5)	(0.6)		(0.6)
自殺/拒否	1	1	2		2
(%)	(0.4)	(0.5)	(0.4)		(0.4)
腸閉塞	2	2	4		4
(%)	(0.7)	(1.0)	(0.8)		(0.8)
肺血栓/肺塞栓		2	2		2
(%)		(1.0)	(0.4)		(0.4)
災害・事故死	3	2	5		5
(%)	(1.1)	(1.0)	(1.1)		(1.1)
その他	31	31	62		62
(%)	(11.5)	(15.2)	(13.1)		(13.1)
不明	20	12	32		32
(%)	(7.4)	(5.9)	(6.8)		(6.8)
合計	270	204	474		474
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	270	204	474		474

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査